

Guia Fotográfico de Aves

# PARQUE ESTADUAL DAS VÁRZEAS DO RIO IVINHEMA

Organizadores

Caio Vinicius de Oliveira Prates

Dione Sales dos Santos

Amanda Nobre Barboza de Souza

Reginaldo Oliveira

Claudenice Faxina



Este guia apresenta parte da diversidade de aves encontrada no Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema, a primeira Unidade de Conservação constituída no estado do Mato Grosso do Sul, que abriga espécies de fauna e flora singulares, sendo referência para a conservação da biodiversidade.

É um local propício para práticas de ecoturismo como o *birdwatching*, aliando a interpretação ambiental e o bem-estar das populações com o mínimo de impactos ambientais, respeitando as diretrizes cabíveis a uma Unidade de Conservação de Proteção Integral.

Organizado com a intenção de colaborar e estimular o interesse sobre a avifauna, e divulgar e incentivar a observação das aves, o guia é fruto do esforço de anos de observação e registros locais com fotos autorais inéditas.

Guia Fotográfico de Aves

# PARQUE ESTADUAL DAS VÁRZEAS DO RIO IVINHEMA



Organizadores

Caio Vinicius de Oliveira Prates

Dione Sales dos Santos

Amanda Nobre Barboza de Souza

Reginaldo Oliveira

Claudenice Faxina

CAMPO GRANDE/MS  
2023

editora **ECO**  
Didática



**SEMADESC**  
Secretaria de Estado  
de Meio Ambiente,  
Desenvolvimento, Ciência,  
Tecnologia e Inovação



**Copyright © 2023 dos autores e da Editora Ecodidática**

Os direitos de edição e publicação foram cedidos à Editora Ecodidática.

Esta obra está licenciada por uma Licença Creative Commons: Atribuição-NãoComercial-Sem Derivações 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND). Disponível em: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>. As citações, o referencial teórico e os textos que compõem este livro são de inteira responsabilidade dos autores.

**Editor-Chefe:** Gleidson Melo

**Assistente Editorial:** Marta Regina da Silva-Melo

**Edição, diagramação e arte visual:** Gleidson Melo e Marta Regina da Silva-Melo

**Capa:** Tricolino [*Pseudocolopteryx sclateri*] - acervo dos autores. Arte: Editora Ecodidática

**Revisão dos textos:** revisado pelos autores

**Edição revisada e atualizada:** *Checklist* com 347 espécies e fotografias [p. 28, 31, 36, 47, 54, 69, 80, 82, 90, 93, 135, 145 e 147]

**Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)  
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)**

Guia fotográfico de aves [livro eletrônico] : Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema / Caio Vinicius de Oliveira Prates... [et al.]. -- 1. ed. -- Campo Grande, MS : Editora Ecodidática, 2023.  
PDF

Outros autores: Dione Sales dos Santos, Amanda Nobre Barboza de Souza, Reginaldo Oliveira, Claudenice Faxina.

ISBN 978-65-85640-01-5

1. Aves 2. Aves - Fotografias 3. Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema I. Prates, Caio Vinicius de Oliveira. II. Santos, Dione Sales III. Souza, Amanda Nobre Barboza de. IV. Oliveira, Reginaldo. V. Faxina, Claudenice.

23-155873

CDD-779.328098171

**Índices para catálogo sistemático:**

1. Aves : Mato Grosso do Sul : Estado : Fotografias

779.328098171

Aline Grazielle Benitez - Bibliotecária - CRB-1/3129

ISBN [livro físico] 978-65-85640-05-3

DOI [livro eletrônico]: 10.56713/editoraecodidatica/85640015

<https://editoraecodidatica.com.br>

[contato@editoraecodidatica.com.br](mailto:contato@editoraecodidatica.com.br)

WhatsApp: +55 67 3211-2328

Instagram: @editoraecodidatica.com.br

## **GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

**Eduardo Corrêa Riedel**

Governador do Estado de Mato Grosso do Sul

**Jaime Elias Verruck**

Secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação – SEMADESC

**Walter Carneiro Junior**

Secretário Adjunto – SEMADESC

**André Borges Barros de Araújo**

Diretor Presidente do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul – IMASUL

**Thais Barbosa de Azambuja Caramori**

Diretora de Desenvolvimento – IMASUL

**Leonardo Tostes Palma**

Gerente de Unidades de Conservação – IMASUL

**Reginaldo Oliveira**

Chefe do Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema

## **Conselho Editorial Científico Multidisciplinar (Doutoras e Doutores)**

**Airton José Vinholi Júnior**

IFMS – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul

**Angela Guida**

UFMS – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

**Antonia Suely Guimarães e Silva**

UEMA – Universidade Estadual do Maranhão

**Ariane Aparecida Carvalho de Arruda**

Pesquisadora em História da América colonial, História do Brasil colonial, Etno-história, História indígena e Arqueologia

**Beatriz Aparecida Alencar**

IFMS – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul

**Daniela Sottili Garcia**

UEMS – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul

**Eduardo Salinas Chavéz**

Instituto de Desarrollo Regional Universidad de Granada, España

**Eliane Rosa da Silva Dilkin**

IFMS – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul

**Fábria Trentin**

UFF – Universidade Federal Fluminense

**Fabio Martins Ayres**

UEMS – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul

**Fábio do Vale**

Faculdade Insted – Instituto Avançado de Ensino Superior e Desenvolvimento Humano

**José Luís dos Santos Peixoto**

UFMS – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

**Larissa Tinoco Barbosa**

Pesquisadora associada ao Instituto Arara Azul

**Luciana Correia Diettrich**

UFMS – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

**Marilyn Aparecida Errobidarte de Matos**

IFMS – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul

**Marta Costa Beck**

UFMS – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

**Marta Regina da Silva-Melo**

UEMS – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul

Atestamos que esta obra foi revisada por pares, sendo indicada para publicação.

# Sumário



<b>9</b>	<b>Prefácio</b>
<b>10</b>	<b>Apresentação</b>
<b>12</b>	<b>Como utilizar este guia</b>
<b>13</b>	<b>Morfologia externa das aves</b>
<b>14</b>	<b>Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema</b>
<b>16</b>	<b>Observação de aves livres na natureza</b>
<b>19</b>	<b>Aves observadas no PEVRI</b>
	Caio Vinicius de Oliveira Prates
	Dione Sales dos Santos
	Amanda Nobre Barboza de Souza
	Reginaldo Oliveira
	Claudenice Faxina
<b>148</b>	<b>Referências</b>
<b>149</b>	<b>Sobre os autores</b>
<b>150</b>	<b>Índice remissivo de nomes científicos</b>
<b>153</b>	<b>Índice remissivo de nomes em português</b>
<b>156</b>	<b>Índice remissivo de nomes em inglês</b>
<b>159</b>	<b>Checklist das espécies registradas no PEVRI</b>





## Prefácio

O Guia das Aves do Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema - PEVRI é um presente para os entusiastas em observação de aves, uma obra construída com muito carinho para auxiliar todos aqueles que desejam observar aves no Parque e além deste. Foi construído para observadores experientes ou iniciantes. A breve descrição de cada espécie aponta, em muitos casos, os detalhes que o usuário deverá observar para identificar a ave corretamente.

Sobre as aves: exuberantes, de beleza que encanta, apresentam penas coloridas a tons mais discretos, ocorrem espécies com comportamentos únicos e curiosos. Representam um dos grupos mais diversos de vertebrados do mundo, com mais de 10.000 espécies conhecidas. Habitam os mais diferentes ambientes. O Brasil é um país riquíssimo em aves, com quase 2.000 espécies identificadas. Somente no Mato Grosso do Sul já foram identificadas mais de 670 espécies de aves, resultado da grande diversidade de ambientes encontrados. E o PEVRI, um pedacinho do Mato Grosso do Sul, abriga mais da metade das espécies que ocorrem no estado inteiro, sejam espécies residentes, migratórias ou vagantes. Isso mostra a grande importância do Parque na conservação e um oásis para a observação de aves.

Assim, dada a importância do PEVRI e a riqueza de aves que esta importante Unidade de Conservação comporta, a elaboração deste guia é mais que uma divulgação técnica ou um instrumento para quem deseja observar aves. É a divulgação da mais profunda emoção de quem já observou aves, há muitos anos neste local e daqueles que estão dia a dia vivenciando e completando toda essa riqueza.

Este guia é o orgulho de quem esteve, está e estará nesta linda Unidade de Conservação observando esses seres alados e emplumados que encantam e fascinam aqueles que os observam.

**Claudence Faxina**

Bióloga Dra. em Ecologia e Conservação



## Apresentação

**N**este ano de 2023, o Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema (PEVRI) completa 25 anos de criação, momento oportuno para reconhecermos os esforços de gestão desta Unidade de Conservação. Dentre as várias oportunidades de atividades turísticas, recreativas e interpretativas na UC, a observação de aves vem se destacando nos últimos anos e tem se revelado com grande potencial, principalmente por estar localizado numa zona de transição entre os biomas Cerrado e Mata Atlântica.

Acompanhando esse processo de perto, a equipe de gestores, guarda-parques e pesquisadores do PEVRI vem atuando sistematicamente para atualizar a lista de espécies de aves do parque, bem como as informações para subsidiar a revisão do Plano de Manejo. Ao longo dos últimos anos, como resultado, já foram registradas 347 espécies de aves, inclusive com o primeiro registro de espécie para o Estado de MS, destacando o gavião-papa-gafanhoto (*Buteo swainsoni*) e a saíra-preciosa (*Stilpnia preciosa*), além de registros de aves ameaçadas de extinção, como a águia-cinzenta (*Urubitinga coronata*) entre outras, confirmando a grande vocação do PEVRI para o *birdwatching*.

Entendemos que o monitoramento das aves em Unidades de Conservação é uma ação de longo prazo, e espera-se que parcerias com Instituições de Ensino, Pesquisa e Extensão possam possibilitar pesquisas que vão além da identificação das espécies, mas que também tragam como resultado a avaliação de tendências das populações de aves no PEVRI e em sua zona de amortecimento, identificando possíveis fatores que possam estar impactando a viabilidade das espécies nessas áreas. Esses resultados, além de informação estratégica para o manejo e gestão da UC, poderiam subsidiar também uma iniciativa que fomente a conservação da avifauna, por meio de engajamento social, pesquisa científica e fortalecimento da economia local no entorno da UC, como a iniciativa da Instância de Gover-

nança Regional do Turismo, Vale das Águas, que tem fomentado as ações de observação de aves no território.

Esta é uma iniciativa pioneira para a região. Espera-se que este esforço possa servir como subsídio inicial para novos estudos e auxiliar os visitantes na identificação das aves do PEVRI, e que possa ser utilizado por professores e condutores como ferramenta de educação ambiental e que possa despertar o interesse do visitante na observação de aves, não só no PEVRI, mas em seu cotidiano.

Reconhecemos as fragilidades, encaramos os desafios e seguimos firmes com o nosso propósito para transformar esta UC em um espaço inspirador de ações positivas no território.

Neste guia que apresenta aproximadamente um terço das aves registradas no Parque, procuramos inserir as espécies com maior presença em cada tipo de ambiente e algumas outras com maior dificuldade de avistamento para desafiar o observador a encontrá-las. Venha conosco conhecer quão rica é a avifauna do Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema.

**Flavia Neri de Moura**

Bacharel em Turismo, Especialista em Gestão de Turismo e

Mestre em Geografia

Fiscal Ambiental – IMASUL



## Como utilizar este guia


EMA

Nome comum em português → Nome científico


Shape da família

Família ← Rheidae

*Rhea americana*



Nome do fotógrafo



Greater Rhea

Nome comum em inglês

Estado de conservação (IUCN)

Média

NT Quase Ameaçada


Possibilidade de avistamento



Lista Vermelha da União Internacional para Conservação da Natureza (IUCN) v. 3.1.



## Morfologia externa das aves



### Legenda:

- |                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| 1 - Píleo              | 14 - Tarso                          |
| 2 - Olho               | 15 - Unha ou garra                  |
| 3 - Fronte ou testa    | 16 - Rabo ou cauda                  |
| 4 - Narina             | 17 - Supracaudais                   |
| 5 - Maxilar            | 18 - Infracaudais                   |
| 6 - Mandíbula          | 19 - Primárias ou rêmiges primárias |
| 7 - Mento              | 20 - Terciárias                     |
| 8 - Bochecha           | 21 - Grandes coberteiras            |
| 9 - Garganta           | 22 - Costas ou dorso                |
| 10 - Encontro          | 23 - Coberteiras médias             |
| 11 - Peito             | 24 - Pescoço                        |
| 12 - Álula             | 25 - Nuca                           |
| 13 - Barriga ou ventre | 26 - Região auricular               |

## Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema

O Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema (PEVRI) possui 73.345,15 hectares localizados na bacia hidrográfica do Rio Paraná, abrangendo os municípios de Jateí, Naviraí e Taquarussu. Criado em 17 de dezembro de 1998, pelo Decreto nº 9278, foi a primeira Unidade de Conservação do estado nesta categoria. Esta região constitui-se na última área livre de represamento do Rio Paraná em território brasileiro. Portanto, o único trecho que mantém as características ecológicas e hidrológicas das Várzeas do Rio Paraná.


O PEVRI é de grande importância para o estado e o país, visto que serve como refúgio para espécies da flora e fauna da região, especialmente para as aves migratórias, para a conservação e proteção da ictiofauna, e as espécies de piracema que compõem este ecossistema.

A equipe do PEVRI já registrou 347 espécies de aves até o momento, o que comprova a vocação e a importância do parque para o turismo de observação de aves. O parque possui estrutura para receber pesquisadores de várias áreas, com o objetivo de conservar os fragmentos de florestas, os remanescentes das várzeas e os ecossistemas associados do Rio Ivinhema e Paraná, assim como promover a conservação da diversidade genética das espécies que habitam o parque, principalmente aquelas ameaçadas de extinção.




**Reginaldo Oliveira**

Chefe do Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema







Legenda:

-  Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema
-  Municípios MS IBGE
-  Drenagem GEO MS

Mapa de Situação do Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema. Fonte: GUC/IMASUL, 14/2/2017. Landsat 8-B654-2016. Datum: SIRGAS 2000. Sistema de projeção Lat/Long.



## Observação de aves livres na natureza

**E**m um mundo cada vez mais conectado artificialmente, cresce um desejo instintivo de ligações ancestrais com o meio, o que o biólogo Edward O. Wilson descreve como “biofilia”, uma tendência inata em que buscamos conexões com outras formas de vida.

Podemos ver esse fenômeno nas visitas aos parques naturais que, em 2021, foi superior desde a série histórica. Sem dúvida, com o evento da pandemia de Covid-19, esse desejo foi catalisado por locais abertos e conservados.

O que as pessoas buscam nessas áreas verdes? Além da ligação, atividades de lazer e turismo ecológico, como cicloturismo, piqueniques com a família e caminhadas em trilhas dentro da floresta ou em campos, sendo essa última igualmente apreciada pelos observadores de aves.

Também conhecida como *birdwatching*, popularmente chamada no Brasil como passarinhar, é uma atividade que consiste em observar o maior número de aves em seu entorno, seja nos quintais, fazendas ou parques, sem interferir no comportamento das espécies ou em seu meio, e pode ser praticada por qualquer pessoa de todas as idades, sem necessariamente ser um especialista em ornitologia. Para isso, algumas dicas são importantes: usar vestuários de cores camufladas, beges ou cremes, calças compridas, assim como botas e proteção para as pernas, as famosas “perneiras”. Não esqueça do chapéu e do repelente, mas evite perfumes acentuados. Caso seja a primeira vez que irá visitar a localidade, procure nas mídias sociais os Clubes de Observadores de Aves (COAs) ou um guia especializado na atividade e na região. Até mesmo as plataformas de ciência cidadã, como Wikiaves, Ebird e Biofaces, podem ajudar a saber mais sobre os *hotspots*, que são áreas com grande presença de espécies.





Os dados gerados pelas plataformas de observação auxiliam pesquisadores para o entendimento de uma única espécie ou até mesmo de um ecossistema inteiro, que por consequência acabam influenciando em políticas públicas ligadas à conservação. Não o bastante, ainda é um importante gerador de renda por meio da conservação. Para se ter uma ideia, só no ano de 2022, o segmento movimentou mais de US\$ 59 bilhões no mercado norte-americano, o que pode ser uma excelente fonte de rendimento para localidades mais afastadas de grandes centros, onde normalmente há uma maior abundância de espécies.

Por isso, se possível, registre e compartilhe sua experiência, convide mais amigos, sempre com muita ética e respeito pelas aves que estarão livres em seu ambiente, pois o convidado somos nós. Com certeza, ao começar a passarinhar, sua visão e audição se tornarão mais aguçadas e a mente terá mais leveza, assim como o dia a dia terá mais cores e calma.

**José Lucas Romero Benito**

Biólogo e especialista em administração de agronegócios





## **AVES OBSERVADAS NO PEVRI**

Caio Vinicius de Oliveira Prates

Dione Sales dos Santos

Amanda Nobre Barboza de Souza

Reginaldo Oliveira

Claudenice Faxina

EMA

*Rhea americana*



Rheidae



Dione Sales

*Greater Rhea*



**NT** Quase Ameaçada

**Tamanho:** 127-180 cm

**Peso:** 20-34 kg

**Habitat:** Várzeas e áreas abertas, preferencialmente com manchas de vegetação mais alta.

**Alimentação:** Brotos, raízes, folhas, frutos, sementes, invertebrados e pequenos vertebrados, como cobras, lagartos, anfíbios, aves e roedores.

**Características:** Tem cor predominantemente cinza, sendo o macho um pouco mais escuro, com a base do pescoço e peito negros.



**ANHUMA**

*Anhima cornuta*



**Anhimidae**



Dione Sales

*Horned Screamer*



**LC** Pouco Preocupante

**Tamanho:** 80-94 cm

**Peso:** 3 kg

**Habitat:** Áreas de várzeas, geralmente próximas aos corpos d'água.

**Alimentação:** Folhas, brotos, flores e raízes de plantas aquáticas, com preferência por partes suculentas; em menor proporção, insetos, principalmente para os filhotes.

**Características:** Possui cor preta, com o ventre branco. Na cabeça, possui uma pena de 12 cm.



IRERÊ

*Dendrocygna viduata*



Anatidae



Dione Sales

*White-faced Whistling-Duck*



Média



Pouco Preocupante

**Tamanho:** 38-48 cm

**Peso:** 502-820 g

**Habitat:** Ambientes aquáticos, incluindo várzeas.

**Alimentação:** Folhas, pequenos frutos, sementes, crustáceos, moluscos e insetos aquáticos.

**Características:** As aves adultas possuem uma máscara branca na face, contrastando com o pescoço negro e o bico chumbo.




**MARRECA-CABOCLA**

*Dendrocygna autumnalis*



Anatidae



Dione Sales

*Black-bellied Whistling-Duck*



Alta



LC Pouco Preocupante

**Tamanho:** 38-53 cm

**Peso:** 0,65-1,02 kg

**Habitat:** Ambientes aquáticos, incluindo várzeas.

**Alimentação:** Basicamente folhas de gramíneas e sementes; ocasionalmente, moluscos e insetos.

**Características:** Sua face é cinzenta, a barriga é preta e possui grande mancha branca na asa, visível quando em voo. Possui bico e pés vermelhos. O jovem é pardo-acinzentado.



**MARRECA-ANANÁ**

*Amazonetta brasiliensis*



Anatidae



Dione Sales



*Brazilian Teal*



Alta

**LC** Pouco Preocupante

**Tamanho:** 35-42 cm

**Peso:** 350-480 g

**Habitat:** Várzeas e outros ambientes aquáticos, especialmente com vegetação marginal baixa e densa.

**Alimentação:** Frutos, folhas, sementes, insetos e pequenos crustáceos.

**Características:** O macho possui o bico vermelho e maior quantidade de verde nas asas quando em voo, enquanto a fêmea possui o bico preto e manchas brancas na base do bico e acima dos olhos.





**POMBA-ASA-BRANCA**

*Patagioenas picazuro*



Columbidae



Dione Sales

*Picazuro Pigeon*



**LC** Pouco Preocupante

**Tamanho:** 34-36 cm

**Peso:** 402 g

**Habitat:** Zonas arbustivas, áreas abertas, interior e bordas de florestas.

**Alimentação:** Frutos, sementes, brotos, folhas jovens e pequenos insetos.

**Características:** Cabeça e partes de baixo marrom, penas da nuca branca com pontas pretas. Costas na maior parte cinza-escuro.



AVOANTE

*Zenaida auriculata*



Columbidae



Dione Sales

*Eared Dove*



Alta

LC Pouco Preocupante

**Tamanho:** 20-28 cm

**Peso:** 95-125 g

**Habitat:** Bordas de florestas, zonas arbustivas e áreas abertas.

**Alimentação:** Sementes de gramíneas, incluindo várias cultivadas.

**Características:** Tem o dorso pardo, cabeça com duas faixas negras laterais e manchas negras nas asas.



**ROLINHA-FOGO-APAGOU**

*Columbina squammata*



Columbidae



Dione Sales

*Scaled Dove*



**LC** Pouco Preocupante

**Tamanho:** 18-22 cm

**Peso:** 40-60 g

**Habitat:** Bordas de florestas, zonas arbustivas e áreas abertas.

**Alimentação:** Áreas abertas e zonas arbustivas.

**Características:** Apresenta aparência “escamada”, possui coloração marrom-acinzentada nas partes superiores, pernas rosadas e bico cinza.



**ANU-BRANCO**

*Guira guira*




Cuculidae



Dione Sales

*Guira Cuckoo*



**Tamanho:** 35-40 cm

**Peso:** 140-143 g

**Habitat:** Áreas abertas e zonas arbustivas, preferencialmente secas.

**Alimentação:** Grilos e gafanhotos, além de pequenos lagartos, cobras, camundongos, ratos e filhotes de outras aves capturados em áreas abertas e semiabertas.

**Características:** É usualmente encontrado em bandos familiares. O adulto apresenta coloração amarelada, uma crista e bico curvo com coloração amarelo-alaranjada.



**ANU-COROCA**

*Crotophaga major*



Cuculidae



Dione Sales

*Greater Ani*



**LC** Pouco Preocupante

**Tamanho:** 41- 46 cm

**Peso:** 145-162 g

**Habitat:** Várzeas e bordas de florestas, sempre às margens dos corpos d'água com vegetação densa.

**Alimentação:** Gafanhotos, grilos, besouros, aranhas, pequenos lagartos e anfíbios, além de frutos e sementes ocasionalmente consumidos.

**Características:** Possui plumagem azul-escura, com olho branco-esverdeado. Seu bico possui uma protuberância. Canta em coro, fazendo bastante barulho.



**ANU-PRETO**

*Crotophaga ani*



Cuculidae




Dione Sales

*Smooth-billed Ani*



Alta



Pouco Preocupante

**Tamanho:** 32-36 cm

**Peso:** 95-115 g

**Habitat:** Bordas de florestas, várzeas, zonas arbustivas e áreas abertas.

**Alimentação:** Grilos, gafanhotos, besouros, vaga-lumes, vespas e pequenos vertebrados, incluindo lagartos, cobras, anfíbios, ovos e filhotes de aves.

**Características:** Sua coloração é preta, possui um bico alto e curto que apresenta uma crista. Possui cauda longa e graduada.



**ALMA-DE-GATO**

*Piaya cayana*



Cuculidae



Dione Sales

*Squirrel Cuckoo*



**LC** Pouco Preocupante

**Tamanho:** 45-47 cm

**Peso:** 98 g

**Habitat:** Interior e bordas de florestas, zonas arbustivas e áreas abertas com manchas de vegetação mais alta.

**Alimentação:** Insetos, lagartas, grilos, gafanhotos, besouros, formigas, traças, anfíbios e répteis pequenos.

**Características:** Apresenta plumagem ferrugínea na parte superior, peito acinzentado, cauda longa, bico amarelo e olhos vermelhos.



**BEIJA-FLOR-TESOURA**

*Eupetomena macroura*



Trochilidae



Dione Sales

*Swallow-tailed Hummingbird*



Baixa



Pouco Preocupante

**Tamanho:** 15-18 cm

**Peso:** 6-9 g

**Habitat:** Bordas de floresta, várzeas, áreas abertas e zonas arbustivas.

**Alimentação:** Principalmente néctar, mas também pequenos artrópodes capturados no ar, na vegetação ou em teias de aranhas.

**Características:** Cabeça, pescoço e parte superior do tórax de um profundo azul-violeta; restante da plumagem verde-escuro. Fêmea com mesma coloração, no entanto, um pouco mais pálida.





**BEIJA-FLOR-DOURADO**

*Hylocharis chrysur*



Trochilidae



Dione Sales

*Gilded Hummingbird*



Alta

**LC** Pouco Preocupante

**Tamanho:** 8-10,5 cm

**Peso:** 4-4,6 g

**Habitat:** Bordas de florestas, várzeas, áreas abertas e zonas arbustivas.

**Alimentação:** Principalmente néctar, mas também pequenos artrópodes capturados no ar, na vegetação ou em teias de aranhas.

**Características:** O macho possui corpo verde com tons dourados, possui o bico vermelho brilhante.



**CARÃO**

*Aramus guarauna*



**Aramidae**



Dione Sales

*Limpkin*



Baixa

**LC** Pouco Preocupante

**Tamanho:** 54-71 cm

**Peso:** 1,05-1,35 kg

**Habitat:** Várzeas e outros ambientes aquáticos.

**Alimentação:** Principalmente gastrópodes, mas inclui outros invertebrados, anfíbios e pequenos répteis capturados na lama ou entre a vegetação alagada.

**Características:** Possui corpo pardo-escuro, bico com mandíbula amarela, cabeça e pescoço estriados de branco e pernas negras.



QUERO-QUERO

*Vanellus chilensis*



Charadriidae



Dione Sales

*Southern Lapwing*



LC Pouco Preocupante

**Tamanho:** 31-40 cm

**Peso:** 280-425 g

**Habitat:** Áreas abertas secas ou às margens dos corpos d'água.

**Alimentação:** Insetos, minhocas e larvas, além de pequenos peixes.

**Características:** Possui uma faixa preta que se estende do pescoço ao peito e um penacho na região posterior da cabeça. Olhos e as pernas são avermelhados.



PERNILONGO-DE-COSTAS-BRANCAS

*Himantopus melanurus*



Recurvirostridae



Dione Sales

*White-backed Stilt*



LC Pouco Preocupante

**Tamanho:** 34-42 cm

**Peso:** 166-205 g

**Habitat:** Ambientes aquáticos lamacentos, tipicamente sobre bancos de areia na periferia de ilhas.

**Alimentação:** Besouros, libélulas, borboletas, mariposas, gastrópodes, bivalves, aranhas, minhocas, pequenos peixes e seus ovos.

**Características:** Apresenta uma coroa branca com uma faixa preta que vai do olho até a parte traseira da cabeça, e suas pernas são de coloração rosa-avermelhada intensa.



JAÇANÃ

*Jacana jacana*



Jacanidae



Acervo do PEVRI

*Wattled Jacana*



LC Pouco Preocupante

**Tamanho:** 21-25 cm

**Peso:** 89-150 g

**Habitat:** Ambientes aquáticos com macrófitas aquáticas flutuantes.

**Alimentação:** Insetos e outros invertebrados que vivem sobre as macrófitas aquáticas; ocasionalmente, peixes muito pequenos.

**Características:** Possui plumagem negra com manto castanho, bico amarelo com escudo frontal vermelho. Os pés são enormes, o que facilita caminhar sobre a vegetação aquática.



TRINTA-RÉIS-PEQUENO

*Sternula superciliaris*



Laridae

Dione Sales



*Yellow-billed Tern*



LC Pouco Preocupante

**Tamanho:** 22-25 cm

**Peso:** 40-57 g

**Habitat:** Ambientes aquáticos, preferencialmente grandes rios.

**Alimentação:** Peixes pequenos, camarões e insetos.

**Características:** Apresenta a coroa e pescoço pretos. A garganta e peito são brancos. Seu longo e robusto bico é amarelo, e seus olhos são marrons.



**TRINTA-RÉIS-GRANDE**

*Phaetusa simplex*



Laridae



Dione Sales

*Large-billed Tern*



Baixa

**LC** Pouco Preocupante

**Tamanho:** 36-43 cm

**Peso:** 208-247 g

**Habitat:** Ambientes aquáticos, preferencialmente grandes rios.

**Alimentação:** Principalmente peixes, mas também insetos.

**Características:** Em plumagem nupcial, apresenta a cabeça com uma coroa preta que se estende até os olhos. O bico é longo e amarelo. A cauda é curta e bifurcada. As pernas são amareladas.



**MAGUARI**

*Ciconia maguari*



**Ciconiidae**



Dione Sales

*Maguari Stork*



**LC** Pouco Preocupante

**Tamanho:** 85-140 cm

**Peso:** 4-4,5 kg

**Habitat:** Ambientes aquáticos com vegetação e várzeas alagadas.

**Alimentação:** Peixes, anfíbios adultos e girinos, pequenos roedores, cobras e insetos aquáticos.

**Características:** Possui plumagem branca, sendo as penas das asas superiores e cauda negras. A região do olho e base do bico são nuas e vermelhas.





TUIUIÚ

*Jabiru mycteria*



Ciconiidae



Dione Sales

*Jabiru*



Média



LC Pouco Preocupante

**Tamanho:** 110-160 cm

**Peso:** 8 kg

**Habitat:** Ambientes aquáticos, especialmente várzeas.

**Alimentação:** Peixes, anfíbios, cobras, tartarugas, aves e pequenos jacarés e mamíferos.

**Características:** O tuiuí é uma ave pernalta, tem pescoço nu e preto. Na parte inferior, o papo também não possui penas e tem coloração vermelha. A plumagem do corpo é branca e as pernas são pretas.



**CABEÇA-SECA**

*Mycteria americana*



Ciconiidae



Dione Sales

*Wood Stork*



Baixa



Pouco Preocupante

**Tamanho:** 65-102 cm

**Peso:** 2-3 kg

**Habitat:** Ambientes aquáticos, em especial várzeas.

**Alimentação:** Principalmente peixes, mas também anfíbios, insetos, filhotes de jacaré, pequenas cobras e mamíferos.

**Características:** Plumagem predominantemente branca, bico preto e longo, cabeça nua e pescoço cinza-escuro, coroa mais clara e faixa preta na nuca.



**BIGUATINGA***Anhinga anhinga*

Anhingidae



Dione Sales

*Anhinga*

Alta



Pouco Preocupante

**Tamanho:** 66-91 cm**Peso:** 1,35 kg**Habitat:** Ambientes aquáticos, preferencialmente águas lentas com margens florestadas.**Alimentação:** Principalmente peixes, mas também anfíbios, répteis, crustáceos e outros invertebrados aquáticos.**Características:** Apresenta asas esbranquiçadas e pescoço fino e longo. Bico longo e amarelo, em forma de punhal, próprio para fugar peixes. Cauda longa, de forma espatulada.

**BIGUÁ**

*Nannopterum brasilianum*



**Phalacrocoracidae**



Dione Sales

*Neotropic Cormorant*



**LC** Pouco Preocupante

**Tamanho:** 63-91 cm

**Peso:** 1,37-1,8 kg

**Habitat:** Ambientes aquáticos, principalmente rios.

**Alimentação:** Quase exclusivamente peixes, mas também certos crustáceos, anfíbios e répteis.

**Características:** Sua plumagem é totalmente preta. Possui pescoço longo, cabeça pequena, bico cinzento-amarelado longo e fino. Possui olhos azuis, pernas e pés palmados de coloração preta.



SOCÓ-BOI

*Tigrisoma lineatum*



Ardeidae



Dione Sales

*Rufescent Tiger-Heron*



Alta



Pouco Preocupante

**Tamanho:** 62-93 cm

**Peso:** 840 g

**Habitat:** Várzeas e outros ambientes aquáticos, quase invariavelmente nas margens entre a vegetação densa e água.

**Alimentação:** Peixes, insetos e larvas aquáticas, crustáceos, anfíbios, cobras e até pequenas aves que captura, permanecendo imóvel por longos períodos entre a vegetação aquática.

**Características:** Possui pescoço castanho com uma faixa branca vertical na frente e manto pardo-acinzentado. O bico é bastante longo.



**GARÇA-MOURA**

*Ardea cocoi*




**Ardeidae**



Dione Sales

*Cocoi Heron*



**Tamanho:** 75-127 cm

**Peso:** 3,2 kg

**Habitat:** Ambientes aquáticos, preferencialmente lânticos e com vegetação circundante.

**Alimentação:** Peixes, anfíbios, cobras e invertebrados capturados na água. Esporadicamente, pequenas aves e mamíferos vivos ou mortos.

**Características:** Possui capuz preto até atrás dos olhos, contíguo com longas plumas na crista. Pescoço branco com listras pretas verticais. Bico amarelo opaco, pernas e pés pretos.



**GARÇA-BRANCA-GRANDE**

*Ardea alba*



**Ardeidae**


Dione Sales



*Great Egret*



Alta



Pouco Preocupante

**Tamanho:** 65-104 cm

**Peso:** 0,7-1,5 kg

**Habitat:** Ambientes aquáticos, preferencialmente lânticos.

**Alimentação:** Peixes, anfíbios, répteis, insetos e crustáceos. Esporadicamente, pequenas aves e mamíferos.

**Características:** Possui plumagem inteiramente branca, o pescoço muito longo forma um "S" quando a ave está em repouso. O bico é longo e amarelo, pernas e dedos pretos e olhos amarelos.



**MARIA-FACEIRA**  
*Syrigma sibilatrix*



Ardeidae



Dione Sales

*Whistling Heron*



**LC** Pouco Preocupante

**Tamanho:** 48-61 cm

**Peso:** 370 g

**Habitat:** Preferencialmente várzeas e áreas abertas secas, às vezes em áreas alagadas.

**Alimentação:** Artrópodes, como libélulas e larvas de besouro, mas também pequenos vertebrados, como cobras, enguias e anfíbios.

**Características:** Face azul-claro, coroa cinza ou preta, que continua com longas penas ornamentais. A plumagem da garganta, pescoço e partes inferiores são amareladas, pernas preto-esverdeadas.





**GARÇA-BRANCA-PEQUENA**

*Egretta thula*



**Ardeidae**



Dione Sales

*Snowy Egret*



**LC** Pouco Preocupante

**Tamanho:** 40-68 cm

**Peso:** 372 g

**Habitat:** Ambientes aquáticos, preferencialmente sem vegetação.

**Alimentação:** Pequenos peixes, crustáceos, insetos aquáticos, moluscos, anfíbios e cobras.

**Características:** Totalmente branca, bico preto com uma mancha amarela em sua base, olhos amarelos, pernas longas pretas com pés amarelos brilhantes.



**CORÓ-CORÓ**

*Mesembrinibis cayennensis*



Threskiornithidae



Dione Sales

*Green Ibis*



Baixa



Pouco Preocupante

**Tamanho:** 47-70 cm

**Peso:** 715-785 g

**Habitat:** Ambientes aquáticos com vegetação florestal circundante e bordas de florestas ciliares.

**Alimentação:** Insetos, minhocas e algumas plantas.

**Características:** O adulto apresenta face e dorso escuros, com reflexos verdes. A garganta e a parte dianteira da cabeça de cor cinza-fosco. O bico é esverdeado, longo e curvado.



**CURICACA**

*Theristicus caudatus*



Threskiornithidae



Dione Sales

*Buff-necked Ibis*



**LC** Pouco Preocupante

**Tamanho:** 57-76 cm

**Peso:** 1,55 kg

**Habitat:** Áreas abertas secas ou úmidas, várzeas e raramente margens dos corpos d'água.

**Alimentação:** Principalmente insetos, mas também aranhas, centopeias, anfíbios, pequenos répteis e mamíferos.

**Características:** Possui coloração clara, asas largas, bico longo e curvo. Apresenta o dorso cinza-claro e uma mancha clara no lado superior da asa, visível durante o voo.



**COLHEREIRO**

*Platalea ajaja*



Threskiornithidae

Dione Sales



*Roseate Spoonbill*



**LC** Pouco Preocupante

**Tamanho:** 55-90 cm

**Peso:** 1,4 kg

**Habitat:** Ambientes aquáticos, preferencialmente sem vegetação.

**Alimentação:** Pequenos peixes e crustáceos (especialmente camarões), besouros aquáticos, moluscos, alguns tipos de fibras vegetais e raízes apanhados em águas rasas.

**Características:** Sua coloração geral é rosada, as pernas são vermelhas. Bico cinza com a forma de uma colher. Os adultos têm cabeça cinzenta e nua.



URUBU-REI

*Sarcoramphus papa*



Cathartidae



Dione Sales

*King Vulture*



Média



Pouco Preocupante

**Tamanho:** 71-81 cm

**Peso:** 3-3,7 kg

**Habitat:** Várzeas, áreas abertas, interior e bordas de florestas.

**Alimentação:** Animais mortos em decomposição, especialmente mamíferos.

**Características:** Tem cabeça e pescoço nus, pintados de vermelho, amarelo e alaranjado. A parte superior do corpo amarelo-clara, asas e cauda são pretas. Em voo, todo branco, exceto o pescoço que é escuro. As pontas das asas e cauda formam um barrado preto.



**URUBU-PRETO**

*Coragyps atratus*



**Cathartidae**




Dione Sales

*Black Vulture*



Alta



Pouco Preocupante

**Tamanho:** 53-68 cm

**Peso:** 1,1-1,9 kg

**Habitat:** Várzeas, áreas abertas, zonas arbustivas, bordas de florestas e margens de ambientes aquáticos.

**Alimentação:** Principalmente animais em decomposição, mas também ovos e animais vivos incapazes de fugir.

**Características:** Cabeça e pescoço nus de coloração cinza-escuro. Plumagem preta. Em voo, apresenta asas largas, e nas pontas há uma mancha clara.



**URUBU-DE-CABEÇA-VERMELHA**

*Cathartes aura*



Cathartidae



Dione Sales

Turkey Vulture



**LC** Pouco Preocupante

**Tamanho:** 55-81 cm

**Peso:** 0,8-2 kg

**Habitat:** Várzeas, áreas abertas, zonas arbustivas, bordas de florestas e ambientes aquáticos.

**Alimentação:** Principalmente animais mortos em decomposição, mas também pequenos animais vivos e algumas frutas.

**Características:** O adulto possui cabeça e pescoço nus e vermelhos. Destaque para um escudo nugal branco. As longas penas das asas são cinza-escuro. Em voo, pode ser confundido com o urubu-de-cabeça-amarela.



**URUBU-DE-CABEÇA-AMARELA**

*Cathartes burrovianus*



Cathartidae

Dione Sales



*Lesser Yellow-headed Vulture*



Alta



Pouco Preocupante

**Tamanho:** 51-69 cm

**Peso:** 0,95-1,55 kg

**Habitat:** Várzeas, áreas abertas, zonas arbustivas, bordas de florestas e ambientes aquáticos.

**Alimentação:** Principalmente animais mortos em decomposição, com certa predileção por peixes; também abate pequenos animais.

**Características:** Cabeça e pescoço nus, amarelo-alaranjados, coroa azul e plumagem predominante preta. Em voo, pode ser confundido com o urubu-de-cabeça-vermelha.






**GAVIÃO-BELO**

*Busarellus nigricollis*



Accipitridae



Dione Sales

*Black-collared Hawk*



Alta



Pouco Preocupante

**Tamanho:** 45-56 cm

**Peso:** 695-796 g

**Habitat:** Ambientes aquáticos com vegetação marginal arbórea.

**Alimentação:** Principalmente peixes, mas também insetos aquáticos, caracóis, lagartos e roedores.

**Características:** Nos adultos, a cabeça é de coloração branca-encardida. O manto, asas e cauda são laranja-marrom. Apresenta uma mancha negra crescente no pescoço.



**GAVIÃO-CARAMUJEIRO**

*Rostrhamus sociabilis*



Accipitridae



Dione Sales

*Snail Kite*



Média



Pouco Preocupante

**Tamanho:** 38-45 cm

**Peso:** 360-393 g

**Habitat:** Ambientes aquáticos com vegetação.

**Alimentação:** Quase exclusivamente caramujos, mas também outros moluscos.

**Características:** A plumagem é cinza-azulado escuro. As pernas são de cor laranja. Seu bico é esbelto, fino e preto, com forte curvatura, e seus olhos são vermelhos.



**GAVIÃO-DO-BANHADO**

*Circus buffoni*



Accipitridae



Dione Sales

*Long-winged Harrier*



Alta



Pouco Preocupante

**Tamanho:** 48-56 cm

**Peso:** 397-605 g

**Habitat:** Várzeas, ambientes aquáticos com vegetação e áreas abertas úmidas.

**Alimentação:** Aves, répteis, anfíbios e mamíferos localizados no chão enquanto plana.

**Características:** Plumagem variável, podendo apresentar forma clara ou escura. No geral, as penas de voo são cinza-claras, barradas de preto, sempre evidentes. Apresenta testa e sobrançelas brancas.



**GAVIÃO-CABOCLO**

*Heterospizias meridionalis*



**Accipitridae**



Dione Sales

*Savanna Hawk*



**LC** Pouco Preocupante

**Tamanho:** 46-60 cm

**Peso:** 0,825-1,069 kg

**Habitat:** Várzeas e bordas de florestas, geralmente próximas aos corpos d'água.

**Alimentação:** Grande variedade de pequenos mamíferos, aves, anfíbios, cobras, lagartos e insetos.

**Características:** O adulto é todo marrom-avermelhado, com a ponta das asas e cauda negras. As pernas e a pele nua das narinas são amarelas.



**GAVIÃO-PRETO**

*Urubitinga urubitinga*



Accipitridae



Dione Sales

*Great Black Hawk*



Baixa



Pouco Preocupante

**Tamanho:** 51-65 cm

**Peso:** 0,853-1,25 kg

**Habitat:** Ambientes aquáticos com vegetação arbórea circundante, interior e bordas de florestas, várzeas, áreas abertas e zonas arbustivas com árvores.

**Alimentação:** Aves, peixes, roedores, anfíbios, lagartos, cobras; ocasionalmente, frutos.

**Características:** Seu padrão de plumagem é negro, com exceção de uma barra branca na cauda. Bico (exceto a ponta) e os tarsos são amarelos.



ÁGUIA-CINZENTA

*Urubitinga coronata*



Accipitridae



Dione Sales

*Crowned Eagle*



Mínima

EN

Em Perigo

**Tamanho:** 62-85 cm

**Peso:** 3 kg

**Habitat:** Bordas de florestas, várzeas, áreas abertas com manchas de floresta e ambientes aquáticos.

**Alimentação:** Presas de médio porte, como tatus, furões, roedores (incluindo filhotes de capivaras), répteis, perdizes, codornas e gambás.

**Características:** Possui uma plumagem geral cinza-chumbo, com penacho em forma de coroa e cauda curta com uma única faixa cinza.



**GAVIÃO-CARIJÓ**

*Rupornis magnirostris*



Accipitridae



Caio Prates

Roadside Hawk



**LC** Pouco Preocupante

**Tamanho:** 33-41 cm

**Peso:** 251-330 g

**Habitat:** Bordas de florestas, áreas abertas e zonas arbustivas.

**Alimentação** Insetos, mas também répteis, anfíbios, peixes, aves e mamíferos de pequeno porte.

**Características:** Possui a ponta do bico negra com a base amarelada; a cabeça e a parte superior das asas são amarronzadas. O peito é ferruginoso e apresenta largas estrias verticais.



**SUINDARA**

*Tyto furcata*



**Tytonidae**



Dione Sales

*American Barn Owl*



**LC** Pouco Preocupante

**Tamanho:** 29-44 cm

**Peso:** 187-700 g

**Habitat:** Bordas de florestas, zonas arbustivas e áreas abertas.

**Alimentação:** Pequenos mamíferos, principalmente roedores, mas também aves, lagartos, cobras, anfíbios, pequenos peixes e artrópodes, além de grandes insetos, aranhas e escorpiões.

**Características:** Possui um disco facial em forma de coração branco, sua cor predominante é cinza e pardo-dourada por cima e por baixo, pintalgada.





**CORUJINHA-DO-MATO**

*Megascops choliba*



Strigidae



Caio Prates

*Tropical Screech-Owl*



Alta

**LC** Pouco Preocupante

**Tamanho:** 20-25 cm

**Peso:** 97-160 g

**Habitat:** Bordas de florestas, áreas abertas e zonas arbustivas com vegetação arbórea.

**Alimentação:** Grilos, gafanhotos, besouros, aranhas, escorpiões e minhocas, além de pequenas cobras, morcegos e ratos.

**Características:** Destacam-se as duas “orelhas” na cabeça. Os olhos são amarelados, destacados na face cinza-clara. Peito cinza com rajados escuros e verticais.



**CABURÉ**

*Glaucidium brasilianum*



Strigidae



Dione Sales

*Ferruginous Pygmy-Owl*



**LC** Pouco Preocupante

**Tamanho:** 15-19 cm

**Peso:** 46-90 g

**Habitat:** Interior e bordas de florestas, zonas arbustivas com árvores.

**Alimentação:** Principalmente insetos e outros artrópodes, incluindo grilos e escorpiões, mas também lagartos, aves, mamíferos e anfíbios.

**Características:** Possui olhos amarelos bem evidentes, com sobranças brancas. Sua cor predominante é cinza, com a coroa rajada e asas pintadas de branco.



**CORUJA-BURAQUEIRA**

*Athene cunicularia*



Strigidae



Dione Sales

*Burrowing Owl*



**LC** Pouco Preocupante

**Tamanho:** 19-26 cm

**Peso:** 130-250 g

**Habitat:** Áreas abertas.

**Alimentação:** Artrópodes, anfíbios, répteis e mamíferos pequenos.

**Características:** Possui a cabeça redonda, sem penachos, e suas pernas são longas e emplumadas. As sobrançelas são brancas e os olhos amarelos. A coloração é cor de terra.



**CORUJA-ORELHUDA**

*Asio clamator*



Strigidae



Dione Sales

Striped Owl



**LC** Pouco Preocupante

**Tamanho:** 36-40 cm

**Peso:** 320-500 g

**Habitat:** Bordas de florestas, zonas arbustivas e áreas abertas com árvores.

**Alimentação:** Pequenos mamíferos (preferencialmente roedores), aves e répteis, além de grandes insetos como gafanhotos.

**Características:** As partes superiores são bege, marrom e canela, apresentando estrias pretas. Apresentam penas que se assemelham a orelhas. Os olhos são marrom-escuros.



**SURUCUÁ-VARIADO**

*Trogon surrucura*



Trogonidae



Dione Sales

*Surucua Trogon*



Média

**LC** Pouco Preocupante

**Tamanho:** 24-26 cm

**Peso:** 73 g

**Habitat:** Interior e bordas de florestas.

**Alimentação:** Larvas, grilos, aranhas, cigarras, cupins, formigas voadoras e frutos.

**Características:** Apresenta a cabeça, pescoço e peito azul-escuro metálico, a parte ventral é vermelha e os olhos são na cor marrom-escuro, sendo envolvidos na cor laranja intenso. A parte inferior da cauda é branca, sem barras.



**UDU-DE-COROA-AZUL**

*Momotus momota*



**Momotidae**



Dione Sales

*Amazonian Motmot*



Alta

**LC** Pouco Preocupante

**Tamanho:** 38-44 cm

**Peso:** 120-160 g

**Habitat:** Interior e bordas de florestas, várzeas e zonas arbustivas com árvores esparsas.

**Alimentação:** Centopeias, moluscos terrestres, minhocas, insetos, répteis, aves, mamíferos pequenos e frutos.

**Características:** As partes superiores da ave são verdes, a cabeça possui uma coroa negra, circundada por uma faixa roxa e azul. A cauda é longa e na ponta das penas centrais aparecem duas raquetes. Move a cauda como um pêndulo.



**MARTIM-PESCADOR-GRANDE**

*Megaceryle torquata*



Alcedinidae



Dione Sales



*Ringed Kingfisher*



**LC** Pouco Preocupante

**Tamanho:** 36-45 cm

**Peso:** 254-330 g

**Habitat:** Ambientes aquáticos com árvores circundantes que servem como poleiro.

**Alimentação:** Principalmente peixes com até 20 cm, incluindo também anfíbios, répteis e insetos.

**Características:** Cinza-azulado por cima, colar branco na nuca e por baixo alaranjado, crista irregular que vai da base do bico até a nuca.



**MARTIM-PESCADOR-VERDE**

*Chloroceryle amazona*



Alcedinidae



Dione Sales



*Amazon Kingfisher*



**LC** Pouco Preocupante

**Tamanho:** 26-35 cm

**Peso:** 98-140 g

**Habitat:** Ambientes aquáticos com árvores circundantes que servem como poleiro.

**Alimentação:** Peixes e crustáceos capturados em mergulhos rasos.

**Características:** Macho com as partes superiores verde-bronze escuras, queixo e garganta brancos, separados do colarinho por estreita linha verde-escura; peito ferrugíneo.





MARTIM-PESCADOR-PEQUENO

*Chloroceryle americana*



Alcedinidae



Dione Sales



*Green Kingfisher*



Alta



Pouco Preocupante

**Tamanho:** 17-22 cm

**Peso:** 29-55 g

**Habitat:** Ambientes aquáticos com vegetação circundante densa.

**Alimentação:** Peixes pequenos, crustáceos, moluscos, libélulas e formigas capturados em mergulhos rasos.

**Características:** Partes superiores em verde-escuro, possui uma faixa branca que liga a base do bico à nuca, as asas possuem três linhas transversais de manchas brancas.



**ARIRAMBA-DE-CAUDA-RUIVA**

*Galbula ruficauda*



Galbulidae



Dione Sales



*Rufous-tailed Jacamar*



Alta



Pouco Preocupante

**Tamanho:** 19-25 cm

**Peso:** 18-28 g

**Habitat:** Zonas arbustivas, interior e bordas de florestas próximos aos corpos d'água.

**Alimentação:** Insetos capturados em voo.

**Características:** No macho, as partes superiores são verdes brilhantes metálicos. O ventre, as penas sob a cauda e a parte de baixo das asas são castanhos. O bico é preto, fino e longo.



**JOÃO-BOBO**

*Nystalus chacuru*



Bucconidae



Dione Sales

*White-eared Puffbird*



Alta



Pouco Preocupante

**Tamanho:** 21-22 cm

**Peso:** 48-64 g

**Habitat:** Bordas de florestas, zonas arbustivas e áreas abertas com vegetação arbórea.

**Alimentação:** Insetos capturados no ar e outros artrópodes, como centopeias e escorpiões, além de pequenos vertebrados como lagartos.

**Características:** A cabeça é grande em relação ao corpo, com os tons negros e cinza, e o bico é de cor avermelhada. Possui coleira branca até a nuca, e a cauda é longa e fina.



**TUCANUÇU**

*Ramphastos toco*



**Ramphastidae**




Dione Sales

*Toco Toucan*



Alta



**Tamanho:** 53-61 cm

**Peso:** 500-860 g

**Habitat:** Bordas de florestas, áreas abertas e zonas arbustivas com árvores.

**Alimentação:** Frutos, insetos, lagartas, ovos e filhotes de outras aves.

**Características:** Sua plumagem é negra, destacando-se o papo branco. Possui uma área de pele nua de cor laranja ao redor dos olhos e as pálpebras azuis. O bico é amarelo-alaranjado.



**ARAÇARI-CASTANHO**

*Pteroglossus castanotis*



Ramphastidae



Dione Sales

*Chestnut-eared Aracari*



Baixa



Pouco Preocupante

**Tamanho:** 37-47 cm

**Peso:** 220-310 g

**Habitat:** Zonas arbustivas com vegetação arbórea alta, interior e bordas de florestas.

**Alimentação:** Frutos, flores, néctar e insetos apanhados na parte alta das árvores, filhotes e ovos de aves.

**Características:** Possui plumagem negra da cabeça à nuca. Há uma base larga no bico, de cor laranja, o peito é amarelo, recortado por uma faixa horizontal vermelha.



**PICAPAUZINHO-ESCAMOSO**

*Picumnus albosquamatus*



**Picidae**



Dione Sales



*White-wedged Piculet*



Alta



Pouco Preocupante

**Tamanho:** 10-11 cm

**Peso:** 9-11 g

**Habitat:** Bordas de florestas, áreas abertas e zonas arbustivas.

**Alimentação:** Pequenos insetos, incluindo larvas e ovos.

**Características:** Possui coloração marrom nas partes superiores e garganta e peito escamados de preto e branco. O macho possui coroa preta salpicada de vermelho na testa.



**PICA-PAU-BRANCO**

*Melanerpes candidus*



Picidae



Dione Sales

White Woodpecker



LC Pouco Preocupante

**Tamanho:** 24-30 cm

**Peso:** 98-136 g

**Habitat:** Bordas de florestas, várzeas, áreas abertas e zonas arbustivas com árvores.

**Alimentação:** Frutas, néctar, insetos e suas larvas; frequentemente ataca ninhos de cupins, marimbondos e vespas.

**Características:** O macho adulto apresenta manto preto, e a parte inferior das costas é branca. Os olhos são rodeados por um amplo anel de coloração amarelo-dourado. A fêmea não possui as penas amarelas na nuca, e a listra preta da cabeça não é tão bem definida.



**BENEDITO-DE-TESTA-AMARELA**

*Melanerpes flavifrons*



Picidae



Dione Sales



*Yellow-fronted Woodpecker*



Média



Pouco Preocupante

**Tamanho:** 17-19,5 cm

**Peso:** 49-64 g

**Habitat:** Zonas arbustivas com árvores, interior e bordas de florestas.

**Alimentação:** Insetos e suas larvas, além de frutos e sementes.

**Características:** Fronte e garganta amarelo-vivos. O macho possui nuca vermelha, peito inferior e ventre vermelhos. Os flancos são barrados de preto e branco.





PICA-PAU-DE-TOPETE-VERMELHO

*Campephilus melanoleucos*



Picidae



Dione Sales



*Crimson-crested Woodpecker*



Baixa



Pouco Preocupante

**Tamanho:** 38 cm

**Peso:** 181-284 g

**Habitat:** Bordas de matas, matas de galeria, e área de várzea com árvores esparsas.

**Alimentação:** Larvas de insetos, frutos.

**Características:** O macho tem a cabeça e topete vermelhos e possui uma faixa branca em cada lado do pescoço.



PICA-PAU-DE-CABEÇA-AMARELA

*Ceileus flavescens*



Picidae



Dione Sales

*Blond-crested Woodpecker*



Baixa



Pouco Preocupante

**Tamanho:** 25-30 cm

**Peso:** 110-165 g

**Habitat:** Interior e bordas de florestas.

**Alimentação:** Insetos, como formigas e cupins arborícolas, além de frutos consumidos regularmente.

**Características:** Cabeça e face amarelas, com topete da mesma cor; macho com faixa vermelha. Partes superiores pretas, barradas de branco, e partes inferiores pretas.



**PICA-PAU-DO-CAMPO**

*Colaptes campestris*



Picidae



Dione Sales



*Campo Flicker*



Alta



Pouco Preocupante

**Tamanho:** 28-33 cm

**Peso:** 145-192 g

**Habitat:** Várzeas, áreas abertas e zonas arbustivas.

**Alimentação:** Formigas, cupins e suas larvas, mas também outros artrópodes.

**Características:** Possui os lados da cabeça e do pescoço amarelos, assim como o peito; o alto da cabeça e a nuca são negros, manto e barriga barrados.



ACAUÃ

*Herpetotheres cachinnans*



Falconidae

Dione Sales



*Laughing Falcon*



Alta

**LC** Pouco Preocupante

**Tamanho:** 50 cm

**Peso:** 700 g

**Habitat:** Interior e bordas de florestas ralas ou secundárias, áreas abertas e zonas arbustivas.

**Alimentação:** Cobras, tanto terrestres como arborícolas, apanhadas normalmente a partir de um galho alto; ocasionalmente, roedores, lagartos, aves e peixes.

**Características:** Cabeçudo, apresenta uma máscara negra nas faces; o dorso, asas e cauda são marrons com as bordas claras. O bico curvo é preto e apresenta uma pequena cere amarelada.



**CARCARÁ**

*Caracara plancus*



Falconidae



Dione Sales

*Crested Caracara*



Alta



Pouco Preocupante

**Tamanho:** 49-63 cm

**Peso:** 834-953 g

**Habitat:** Interior e bordas de florestas, várzeas, margens de ambientes aquáticos, áreas abertas e zonas arbustivas.

**Alimentação:** Principalmente animais mortos em decomposição, mas também captura presas vivas, como tartarugas, filhotes de aves (especialmente em ninhais).

**Características:** Possui topete preto, bico alto e vermelho. É recoberto de preto na parte superior e possui o peito marrom-claro com riscas pretas.



QUIRIQUIRI

*Falco sparverius*



Falconidae



Dione Sales



*American Kestrel*



Alta



Pouco Preocupante

**Tamanho:** 21-31 cm

**Peso:** 80-165 g

**Habitat:** Várzeas, áreas abertas, zonas arbustivas e bordas de florestas.

**Alimentação:** Principalmente insetos, mas também roedores, aves e répteis.

**Características:** O macho é cinza-azulado no alto da cabeça e nas asas, as costas e a cauda são marrons. Possui uma mancha negra abaixo do olho e outra linha no lado da cabeça.



**FALCÃO-DE-COLEIRA***Falco femoralis*


Falconidae



Dione Sales

*Aplomado Falcon*

Alta



Pouco Preocupante

**Tamanho:** 33-45 cm**Peso:** 261-407 g**Habitat:** Várzeas, áreas abertas e zonas arbustivas com árvores, além de bordas de florestas.**Alimentação:** Principalmente insetos e roedores, mas também aves, morcegos e lagartos. Também caçam peneirando.**Características:** A cabeça, coroa, nuca e manto são cinzas, bochechas e garganta são brancas. O início do bico é amarelo, tarsos e pés também são amarelados.

**PERIQUITO-DE-ENCONTRO-AMARELO**

*Brotogeris chiriri*



Psittacidae



Dione Sales

*Yellow-chevroned Parakeet*



Alta



Pouco Preocupante

**Tamanho:** 20-23,5 cm

**Peso:** 52-68 g

**Habitat:** Várzeas, bordas e interior de florestas.

**Alimentação:** Flores, sementes e frutos; frequentemente visita pomares.

**Características:** Apresenta uma faixa amarela na região superior das asas, visíveis em voo. Coloração amarelo-esverdeada em sua face. Possui bico resistente e de cor branco-amarronzada.





**PAPAGAIO-VERDADEIRO**

*Amazona aestiva*



Psittacidae



Dione Sales

*Turquoise-fronted Parrot*



Alta

NT

Quase Ameaçada

**Tamanho:** 35-38 cm

**Peso:** 400 g

**Habitat:** Bordas de florestas, várzeas, áreas abertas e zonas arbustivas com árvores altas.

**Alimentação:** Frutas, sementes, brotos, folhas, flores, néctar e coquinhos.

**Características:** Possui cabeça amarela, com azul-esverdeado na fronte e bochecha, ombros vermelhos delineados com amarelo, asa com parte vermelha. O resto do corpo é verde.



TUIM

*Forpus xanthopterygius*



Psittacidae



Dione Sales

*Blue-winged Parrotlet*



Alta



Pouco Preocupante

**Tamanho:** 10-13 cm

**Peso:** 30 g

**Habitat:** Bordas de florestas, áreas abertas e zonas arbustivas com árvores.

**Alimentação:** Frutos e sementes em vegetação secundária, incluindo sementes de gramíneas e embaúba.

**Características:** O corpo é todo verde, um pouco mais escuro nas costas. O macho possui uma área azul na superfície inferior da asa.



**PERIQUITO-REI**

*Eupsittula aurea*



Psittacidae



Dione Sales

*Peach-fronted Parakeet*



Alta



Pouco Preocupante

**Tamanho:** 23-28 cm

**Peso:** 74-94 g

**Habitat:** Áreas abertas, zonas arbustivas e várzeas secas com árvores, além de bordas de florestas.

**Alimentação:** Frutos, folhas, brotos, sementes, larvas, besouros e outros invertebrados.

**Características:** Possui cabeça verde com uma faixa dianteira cor de pêssego, face azulada, ventre verde-amarelado. Nos adultos, a região ao redor dos olhos é laranja.



**MARACANÃ**

*Primolius maracana*



**Psittacidae**



Dione Sales

*Blue-winged Macaw*



Média

**NT** Quase Ameaçada

**Tamanho:** 36-43 cm

**Peso:** 246-266 g

**Habitat:** Interior e bordas de florestas, várzeas, áreas abertas e zonas arbustivas com árvores.

**Alimentação:** Frutos, sementes, coquinhos e outras partes de vegetais.

**Características:** Cor predominante verde, com face nua branca-amarelada, testa vermelha, coroa azul e mancha vermelha no dorso.



**ARARA-CANINDÉ**

*Ara ararauna*



**Psittacidae**



Dione Sales

*Blue-and-yellow Macaw*



Baixa



Pouco Preocupante

**Tamanho:** 80-86 cm

**Peso:** 0,995-1,38 kg

**Habitat:** Florestas, principalmente aquelas com a presença de buri-tis e áreas semiabertas.

**Alimentação:** Frutos, sementes, folhas, flores, brotos, coquinhos e néctar.

**Características:** Possui coloração azul no dorso e amarelo-dourado na parte inferior, desde a face e ventre até o rabo. Apresenta garganta com linha negra e uma área nua na cabeça com linha de penas negras.



**ARARA-VERMELHA**

*Ara chloropterus*



**Psittacidae**



Dione Sales

*Red-and-green Macaw*



Baixa

**LC** Pouco Preocupante

**Tamanho:** 78-95 cm

**Peso:** 1,05-1,71 kg

**Habitat:** Interior e bordas de florestas.

**Alimentação:** Frutos, sementes, folhas, flores, brotos, coquinhos e néctar.

**Características:** Apresenta coloração vermelha, bico bicolor, face nua e branca com fileiras de penas vermelhas. Possui região verde na parte média das asas, que se estende até a parte de trás. As extremidades das asas são azuis.



## PERIQUITÃO

*Psittacara leucophthalmus*



Psittacidae



Dione Sales

White-eyed Parakeet



Alta



Pouco Preocupante

**Tamanho:** 30-36 cm

**Peso:** 100-218 g

**Habitat:** Interior e bordas de florestas, várzeas, áreas abertas e zonas arbustivas com árvores.

**Alimentação:** Frutos, sementes, coquinhos e outras partes de vegetais.

**Características:** Possui coloração geral verde, com algumas penas vermelhas nos lados da cabeça e pescoço, além de algumas penas vermelhas nas asas.



**CHOCA-BARRADA**

*Thamnophilus doliatus*



**Thamnophilidae**



Dione Sales



*Barred Antshrike*



Alta

**LC** Pouco Preocupante

**Tamanho:** 15-16 cm

**Peso:** 24-30 g

**Habitat:** Bordas de florestas, várzeas e zonas arbustivas.

**Alimentação:** Principalmente insetos, incluindo besouros, grilos, larvas, formigas e outros artrópodes, como aranhas.

**Características:** O macho é todo barrado (razão de um dos nomes comuns), exceto pelo negro uniforme no alto da cabeça. A fêmea é marrom, com os lados da cabeça estriados.





**CHORÓ-BOI***Taraba major*

Thamnophilidae



Dione Sales

*Great Antshrike*

Alta



Pouco Preocupante

**Tamanho:** 20-20,5 cm**Peso:** 50-70 g**Habitat:** Bordas de florestas e zonas arbustivas, frequentemente à beira dos corpos d'água.**Alimentação:** Grande variedade de insetos e outros artrópodes, além de moluscos e pequenos vertebrados, incluindo lagartos, anfíbios, mamíferos e filhotes de outras aves.**Características:** O macho apresenta dorso negro, em forte contraste com o branco da região ventral, asas com faixas brancas. Destaca-se o vermelho intenso dos olhos na ave adulta. A fêmea é marrom-avermelhada na parte superior, e é quase sempre vista com o macho.

**ARAPAÇU-DE-CERRADO**

*Lepidocolaptes angustirostris*



**Dendrocolaptidae**

Dione Sales



*Narrow-billed Woodcreeper*



Alta



Pouco Preocupante

**Tamanho:** 18-22 cm

**Peso:** 23-39,5 g

**Habitat:** Bordas de florestas, várzeas, zonas arbustivas e áreas abertas com a presença de árvores.

**Alimentação:** Grande variedade de artrópodes e outros invertebrados, mas também pequenos vertebrados.

**Características:** Bico longo curvo e claro; por cima, ferrugíneo intenso; sobrancelha branca vistosa, por baixo é branco-sujo.



**JOÃO-DE-BARRO**

*Furnarius rufus*



Furnariidae



Dione Sales

*Rufous Hornero*



**LC** Pouco Preocupante

**Tamanho:** 16-23 cm

**Peso:** 31-65 g

**Habitat:** Bordas de florestas, zonas arbustivas e áreas abertas com árvores.

**Alimentação:** Artrópodes como besouros, borboletas, formigas, larvas e aranhas, bem como outros invertebrados como caracóis e lesmas.

**Características:** Possui o dorso marrom-avermelhado, uma suave sobranalha formada por penas mais claras e uma coloração clara na barriga, sendo o queixo e pescoço brancos.



**GRAVETEIRO**

*Phacellodomus ruber*




Furnariidae



Dione Sales

*Greater Thornbird*



**Tamanho:** 18-21 cm

**Peso:** 35-51 g

**Habitat:** Bordas de florestas e zonas arbustivas, sempre às margens dos corpos d'água.

**Alimentação:** Artrópodes, como formigas e besouros.

**Características:** A plumagem de toda a parte dorsal é marrom, a coroa, asas e cauda são acastanhadas. Possui uma curta e fina faixa pós-ocular preta. Seus olhos são de coloração amarelo intenso.



PETRIM

*Synallaxis frontalis*



Furnariidae



Dione Sales

*Sooty-fronted Spinetail*



Baixa



Pouco Preocupante

**Tamanho:** 14-16 cm

**Peso:** 11-17 g

**Habitat:** Entre a vegetação mais densa nas zonas arbustivas e bordas de florestas.

**Alimentação:** Artrópodes e outros invertebrados.

**Características:** Coloração geral marrom-acastanhada, sua coroa é castanho-avermelhada. A área ventral é de coloração cinza-claro.



**FERREIRINHO-RELÓGIO**

*Todirostrum cinereum*



Rhynchocyclidae



Dione Sales

*Common Tody-Flycatcher*



Alta



Pouco Preocupante

**Tamanho:** 8-10 cm

**Peso:** 6-8 g

**Habitat:** Bordas de florestas, zonas arbustivas e áreas abertas com árvores.

**Alimentação:** Pequenos artrópodes, como besouros, aranhas, cupins e formigas aladas, mariposas e borboletas, capturados em voo.

**Características:** Possui uma cor cinza-azulada escura na cabeça, com a parte ventral amarela. Os olhos são amarelo-ouro, o bico é escuro, longo e chato.



**RISADINHA***Camptostoma obsoletum*

Tyrannidae



Dione Sales

*Southern Beardless-Tyrannulet*

Alta



Pouco Preocupante

**Tamanho:** 9-12 cm**Peso:** 8-9 g**Habitat:** Bordas de florestas, zonas arbustivas e áreas abertas com árvores.**Alimentação:** Cupins e formigas aladas, mariposas, besouros e borboletas, além de alguns pequenos frutos, como erva-de-passarinho.**Características:** A cabeça é um pouco mais acinzentada do que as costas, levemente esverdeada, com o bico escuro na ponta e base alaranjada. Costuma eriçar as penas do alto da cabeça. É mais facilmente identificada pela vocalização, que se assemelha a uma “risadinha” (hihihihi).

**GUARACAVA-DE-BARRIGA-AMARELA**

*Elaenia flavogaster*



Tyrannidae



Dione Sales

*Yellow-bellied Elaenia*



Alta

**LC** Pouco Preocupante

**Tamanho:** 14-18 cm

**Peso:** 25-30 g

**Habitat:** Bordas de florestas, zonas arbustivas e áreas abertas com árvores.

**Alimentação:** Artrópodes, como besouros, cupins e formigas aladas, borboletas e mariposas.

**Características:** Exibe uma crista arrepiada bem evidente, especialmente ao cantar. Sua cor é pardo-olivácea por cima, com garganta branca, peito acinzentado e barriga amarela.





TRICOLINO

*Pseudocolopteryx sclateri*



Tyrannidae



Dione Sales

*Crested Doradito*



LC Pouco Preocupante

**Tamanho:** 9-12 cm

**Peso:** 7-8 g

**Habitat:** Várzeas e outros ambientes aquáticos com vegetação.

**Alimentação:** Pequenos artrópodes, como besouros, borboletas, grilos, mariposas e aranhas.

**Características:** Cor oliva por cima, dorso manchado de escuro, face e cristas pretas com estrias branco-amareladas; por baixo, amarelo-vivo.



**MARIA-CAVALEIRA**

*Myiarchus ferox*



Tyrannidae



Dione Sales

*Short-crested Flycatcher*



Alta



Pouco Preocupante

**Tamanho:** 18-20 cm

**Peso:** 24-30,1 g

**Habitat:** Partes altas e médias das áreas abertas com árvores, zonas arbustivas e bordas de florestas.

**Alimentação:** Principalmente insetos voadores, como besouros, mariposas, borboletas e moscas.

**Características:** A garganta e parte superior são cinzas, com a barriga amarela. Dorso escuro, com a cabeça relativamente grande e penas do topete mantidas semierçadas.



**BEM-TE-VI**

*Pitangus sulphuratus*



Tyrannidae



Dione Sales

*Great Kiskadee*



**LC** Pouco Preocupante

**Tamanho:** 22-26 cm

**Peso:** 54-79 g

**Habitat:** Bordas de florestas, áreas abertas, zonas arbustivas, várzeas e ambientes aquáticos com vegetação.

**Alimentação:** Lagartas, abelhas, marimbondos, borboletas, mariposas, grilos, gafanhotos, crustáceos e pequenos vertebrados.

**Características:** Tem o dorso pardo e a barriga em amarelo-vivo; uma listra branca no alto da cabeça. A garganta é de cor branca. Possui um topete amarelo, somente visível em determinadas situações.



**SUIRIRI-CAVALEIRO**

*Machetornis rixosa*



Tyrannidae



Dione Sales

Cattle Tyrant



**LC** Pouco Preocupante

**Tamanho:** 17-20 cm

**Peso:** 28-37 g

**Habitat:** Áreas abertas com gramíneas.

**Alimentação:** Mariposas, besouros, grilos, larvas, borboletas e lagartas.

**Características:** O peito é amarelo, a garganta clara, e as partes superiores marrons. A cabeça é cinza com uma mancha laranja, em geral oculta.



**BENTEVIZINHO-DE-PENACHO-VERMELHO**

*Myiozetetes similis*



Tyrannidae



Dione Sales

*Social Flycatcher*



Média

**LC** Pouco Preocupante

**Tamanho:** 16-17,5 cm

**Peso:** 28 g

**Habitat:** Bordas de florestas, áreas abertas alagadas e zonas arbustivas com árvores.

**Alimentação:** Artrópodes, como besouros, mariposas, borboletas, grilos e moscas, também alguns pequenos frutos.

**Características:** Coroa cinza-escura com mancha laranja semiculta, sobrancheira branca e máscara negra, garganta branca e ventre amarelo.



**TESOURINHA**

*Tyrannus savana*



Tyrannidae



Dione Sales

*Southern Fork-tailed Flycatcher* ■ ■ ■ ■ Média LC Pouco Preocupante

**Tamanho:** 27-40 cm

**Peso:** 29-32 g

**Habitat:** Áreas abertas, zonas arbustivas e várzeas.

**Alimentação:** Principalmente insetos voadores, como moscas, gafanhotos, borboletas e mariposas, além de pequenos frutos.

**Características:** O capuz é negro, garganta e partes inferiores brancas. Dorso cinza uniforme, com destaque para a longa cauda, que é maior do que o próprio corpo.



**FREIRINHA**

*Arundinicola leucocephala*



Tyrannidae



Dione Sales



*White-headed Marsh Tyrant*



Média



Pouco Preocupante

**Tamanho:** 10-14 cm

**Peso:** 16 g

**Habitat:** Ambientes aquáticos com vegetação.

**Alimentação:** Pequenos artrópodes, como besouros, aranhas, grilos, lagartas, larvas e borboletas capturados junto à vegetação aquática.

**Características:** O macho é quase todo preto, com apenas a cabeça e a garganta brancas. A fêmea tem as partes superiores marrom-acinzentadas e inferiores esbranquiçadas.



**LAVADEIRA-MASCARADA**

*Fluvicola nengeta*



Tyrannidae



Dione Sales

*Masked Water-Tyrant*



**LC** Pouco Preocupante

**Tamanho:** 16 cm

**Peso:** 20 g

**Habitat:** Ambientes aquáticos com vegetação, várzeas alagadas e áreas abertas perto da água.

**Alimentação:** Artrópodes, como gafanhotos, grilos, lagartas, besouros, mariposas, aranhas e larvas.

**Características:** Sua coloração é branca, contrastando com uma estreita faixa preta nos olhos. As asas possuem tons castanho-acinzentados mais escuros que o manto.





PRÍNCIPE

*Pyrocephalus rubinus*

Tyrannidae



Dione Sales

*Vermilion Flycatcher*

Média



Pouco Preocupante

**Tamanho:** 13-14 cm**Peso:** 11-14 g**Habitat:** Áreas abertas, várzeas e zonas arbustivas com árvores esparsas.**Alimentação:** Insetos voadores, como moscas, besouros, borboletas e mariposas.**Características:** O macho, em plumagem de reprodução, é inconfundível. O vermelho vivo da parte ventral contrasta com o dorso escuro. Atrás dos olhos, há uma faixa branca. A fêmea possui cauda mais curta.

TESOURA-DO-BREJO

*Gubernetes yetapa*



Tyrannidae



Dione Sales

*Streamer-tailed Tyrant*



LC Pouco Preocupante

**Tamanho:** 37-44 cm

**Peso:** 64-70 g

**Habitat:** Ambientes aquáticos com vegetação herbáceas, incluindo várzeas.

**Alimentação:** Artrópodes, como aranhas, grilos, gafanhotos, besouros, borboletas e mariposas.

**Características:** Possui uma cauda longa e bifurcada. A parte superior é cinzenta, as asas e a cauda são negras, a garganta é branca e contornada por uma faixa castanha.



**VIUVINHA-DE-ÓCULOS**  
*Hymenops perspicillatus*



Tyrannidae



Dione Sales



*Spectacled Tyrant*

■ ■ ■ Baixa

LC Pouco Preocupante

**Tamanho:** 16 cm

**Peso:** 32 g

**Habitat:** Banhados e áreas de várzea.

**Alimentação:** Insetos, lagartas, grilos, gafanhotos e besouros.

**Características:** A fêmea possui coloração parda, com estrias no peito e ventre. Uma listra superciliar de coloração clara pode estar presente. O macho apresenta plumagem quase totalmente preta.



**NOIVINHA-BRANCA**

*Xolmis velatus*



Tyrannidae

Dione Sales



*White-rumped Monjita*



**LC** Pouco Preocupante

**Tamanho:** 19-24,2 cm

**Peso:** 37,3-46,3 g

**Habitat:** Áreas abertas e várzeas com árvores.

**Alimentação:** Gafanhotos, grilos, besouros, moscas, lagartas e aranhas.

**Características:** Cabeça esbranquiçada, cauda branca, assim como a base. Asas escuras com filetes brancos.



**GRALHA-DO-CAMPO**

*Cyanocorax cristatellus*



Corvidae



Dione Sales

*Curl-crested Jay*



**LC** Pouco Preocupante

**Tamanho:** 40 cm

**Peso:** 178 g

**Habitat:** Vive em áreas abertas com árvores esparsas, ocorre ainda em sedes de fazendas e chácaras.

**Alimentação:** Frutos, insetos, sementes, bagas, pequenos répteis, ovos de outras espécies de pássaros e de aves domésticas como a galinha.

**Características:** Tem um característico topete frontal alongado. Plumagem azul-escura; parte interior do pescoço e garganta pretas; barriga e ponta da cauda brancas.



**GRALHA-PICAÇA**

*Cyanocorax chrysops*



Corvidae



Dione Sales

*Plush-crested Jay*



Média

**LC** Pouco Preocupante

**Tamanho:** 32-35 cm

**Peso:** 138-225 g

**Habitat:** Interior e bordas de florestas, zonas arbustivas e áreas abertas com árvores.

**Alimentação:** Frutos, artrópodes, ovos e filhotes de outras aves, pequenos répteis, anfíbios e roedores.

**Características:** Possui cor azul-escura, cabeça e pescoço são negros, peito e ponta da cauda brancas. As penas da cabeça formam uma almofada, possui uma mancha azul reluzente e olhos amarelo-enzofre.



**ANDORINHA-GRANDE**

*Progne chalybea*



Hirundinidae



Dione Sales

*Gray-breasted Martin*



Alta



Pouco Preocupante

**Tamanho:** 18-20 cm

**Peso:** 43-50 g

**Habitat:** Áreas abertas e zonas arbustivas.

**Alimentação:** Insetos, como formigas e cupins alados, mutucas, libélulas, besouros, mariposas, moscas e vespas.

**Características:** Apresenta cabeça e costas pretas e azul-metálico. A face tem uma máscara preta-fosca, mais escura abaixo dos olhos. O peito e a barriga são branco-acinzentados.



**JAPACANIM**

*Donacobius atricapilla*



**Donacobiidae**



Dione Sales

*Black-capped Donacobius*



Alta



Pouco Preocupante

**Tamanho:** 21-23 cm

**Peso:** 43 g

**Habitat:** Ambientes aquáticos com vegetação emersa e várzeas.

**Alimentação:** Artrópodes, como besouros, grilos, formigas, aranhas, lagartas, larvas e libélulas.

**Características:** Possui a cauda longa e graduada. A cabeça, dorso e asas são pretos. O peito e o ventre são amarelos, inclusive os olhos. Possui uma mancha amarela mais escura no pescoço.






**SABIÁ-BARRANCO**

*Turdus leucomelas*



Turdidae



Dione Sales

*Pale-breasted Thrush*



Alta



Pouco Preocupante

**Tamanho:** 21-25 cm

**Peso:** 54-60 g

**Habitat:** Áreas abertas com alguma vegetação arbórea, zonas arbustivas, interior e bordas de florestas.

**Alimentação:** Frutos silvestres ou cultivados e invertebrados, como gafanhotos, grilos, besouros, lagartas, minhocas e aranhas.

**Características:** Possui cabeça acinzentada nos lados e olivácea na parte alta, tom acinzentado nas costas e no peito, e marrons nas asas, com a garganta branca e listras cinza-escuro.



**SABIÁ-DO-CAMPO**

*Mimus saturninus*



Mimidae

Dione Sales



*Chalk-browed Mockingbird*



Alta



Pouco Preocupante

**Tamanho:** 25-27 cm

**Peso:** 73-83 g

**Habitat:** Áreas abertas, várzeas secas e zonas arbustivas.

**Alimentação:** Invertebrados, como gafanhotos, grilos, aranhas, besouros, minhocas, lagartas, além de frutos, sementes, néctar e flores.

**Características:** Possui coloração cinzenta no dorso, cabeça, asas e cauda. O peito e o ventre são branco-amarelados. A listra superciliar é branca, destacada pela faixa negra na altura dos olhos.



FIM-FIM

*Euphonia chlorotica*



Fringillidae



Dione Sales



*Purple-throated Euphonia*



Alta



Pouco Preocupante

**Tamanho:** 9-12 cm

**Peso:** 8-11 g

**Habitat:** Bordas de florestas, áreas abertas e zonas arbustivas com árvores.

**Alimentação** Principalmente pequenos frutos, como erva-de-passarinho e embaúba, mas também pequenos artrópodes.

**Características:** O macho é preto-azulado por cima, com testa amarela, garganta preta e amarela por baixo. A fêmea é verde-olivácea, com fronte amarelada e ventre esbranquiçado.



**TICO-TICO-DO-CAMPO**

*Ammodramus humeralis*



Passerellidae



Dione Sales

*Grassland Sparrow*



Alta

**LC** Pouco Preocupante

**Tamanho:** 11-13 cm

**Peso:** 15-18 g

**Habitat:** Áreas abertas com vegetação rasteira.

**Alimentação:** Sementes e pequenos invertebrados, como grilos, minhocas, lagartas e besouros.

**Características:** Possui um forte amarelo superciliar. A plumagem é riscada em tons de marrom-escuro e negro, contrastando com o cinza dominante.



TICO-TICO

*Zonotrichia capensis*



Passerellidae



Dione Sales

*Rufous-collared Sparrow*



Baixa

LC

Pouco Preocupante

**Tamanho:** 12-16 cm

**Peso:** 19-25 g

**Habitat:** Áreas abertas, zonas arbustivas e bordas de florestas.

**Alimentação:** Sementes e pequenos artrópodes, como grilos, lagartas, formigas, besouros, aranhas e larvas.

**Características:** A coloração dorsal é pardo-acinzentada, com a cabeça cinza e duas tiras negras que partem da base da maxila até a nuca, apresentando uma parte central cinza. O pescoço possui uma faixa de cor vermelho-ferrugínea.



**POLÍCIA-INGLESA-DO-SUL**

*Leistes superciliaris*



Icteridae



Dione Sales



*White-browed Meadowlark*



Alta



Pouco Preocupante

**Tamanho:** 17-20 cm

**Peso:** 39-53 g

**Habitat:** Áreas abertas, principalmente campos.

**Alimentação:** Sementes, brotos de plantas herbáceas e invertebrados, como besouros, grilos, gafanhotos, lagartas, larvas, minhocas e aranhas.

**Características:** No macho, a gola e o peito são de um belo vermelho-escuro. Uma estria branca parte do olho e se estende até o pescoço, enquanto o restante da plumagem é predominantemente negro.



**JOÃO-PINTO**

*Icterus croconotus*



Icteridae



Dione Sales

*Orange-backed Troupial*



Alta



Pouco Preocupante

**Tamanho:** 21-23 cm

**Peso:** 60-70 g

**Habitat:** Bordas de florestas e zonas arbustivas com árvores.

**Alimentação:** Artrópodes, como gafanhotos, grilos, lagartas, besouros, mariposas, aranhas e larvas, além de néctar, flores e frutos.

**Características:** Possui cor laranja-vivo na maior parte do corpo, com exceção da faixa frontal e das asas, que são pretas. Em cada asa, destaca-se uma discreta faixa branca.



ENCONTRO

*Icterus pyrrhopterus*



Icteridae



Dione Sales

*Variable Oriole*



Alta

LC Pouco Preocupante

**Tamanho:** 19-22 cm

**Peso:** 29-43 g

**Habitat:** Bordas de florestas e áreas abertas com árvores.

**Alimentação:** Artrópodes, como gafanhotos, grilos, lagartas, besouros, mariposas, aranhas e larvas, além de néctar.

**Características:** Cor predominante preta e longa cauda. Sobre as asas, apresenta uma área de penas diferenciadas com coloração que varia do amarelo ao castanho forte. Imita outras aves.





**CARDEAL-DO-BANHADO**

*Amblyramphus holosericeus*



Icteridae



Dione Sales

*Scarlet-headed Blackbird*



Média



Pouco Preocupante

**Tamanho:** 22-25 cm

**Peso:** 75-86 g

**Habitat:** Ambientes aquáticos com vegetação, em especial áreas de várzeas.

**Alimentação:** Artrópodes, como besouros, aranhas, grilos, gafanhotos, lagartas e larvas, além de sementes e grãos.

**Características:** Apresenta a cabeça, pescoço e peito de coloração vermelho-alaranjada, assim como a plumagem das coxas. O dorso, asas e ventre são pretos.



**PÁSSARO-PRETO**

*Gnorimopsar chopi*



Icteridae



Dione Sales

*Chopi Blackbird*



**LC** Pouco Preocupante

**Tamanho:** 21-25,5 cm

**Peso:** 75-84 g

**Habitat:** Áreas abertas com árvores esparsas.

**Alimentação:** Grãos, inclusive os cultivados, frutos e artrópodes, como cupins, grilos, lagartas, besouros, aranhas e gafanhotos.

**Características:** É inteiramente negro, incluindo pernas, bico, olhos e penas, o que origina seu nome popular.



**CARRETÃO-DO-OESTE**

*Agelasticus cyanopus*



Icteridae




Dione Sales

*Yellow-breasted Blackbird*



Alta



Pouco Preocupante

**Tamanho:** 18-19,5 cm

**Peso:** 41 g

**Habitat:** Ambientes aquáticos com vegetação e áreas de várzeas.

**Alimentação:** Sementes e invertebrados, como besouros, aranhas, grilos, gafanhotos, lagartas e larvas.

**Características:** Coloração geral negra uniforme com brilho de seda.



**CHUPIM-DO-BREJO**

*Pseudoleistes guirahuro*



Icteridae



Dione Sales

*Yellow-rumped Marshbird*



Alta



Pouco Preocupante

**Tamanho:** 22-25 cm

**Peso:** 70-98 g

**Habitat:** Várzeas e áreas abertas úmidas ou secas.

**Alimentação:** Sementes, grãos e vários artrópodes, como besouros, aranhas, grilos, gafanhotos, lagartas e larvas.

**Características:** Penas do início das asas, cauda e barriga amarelos; bico preto e pontiagudo.



PIA-COBRA

*Geothlypis aequinoctialis*



Parulidae



Dione Sales



*Masked Yellowthroat*



Alta



Pouco Preocupante

**Tamanho:** 13-14 cm

**Peso:** 11-14 g

**Habitat:** Várzeas e zonas arbustivas próximas aos corpos d'água.

**Alimentação:** Pequenos artrópodes, como besouros, aranhas, grilos, borboletas, mariposas e lagartas.

**Características:** O macho possui o alto da cabeça cinza com uma máscara preta na região dos olhos; por baixo, amarelo-vivo.



**CANÁRIO-DO-CAMPO**

*Emberizoides herbicola*



Thraupidae



Dione Sales

*Wedge-tailed Grass-Finch*



Alta



Pouco Preocupante

**Tamanho:** 18-20 cm

**Peso:** 27-30 g

**Habitat:** Várzeas e zonas arbustivas.

**Alimentação:** Sementes e invertebrados, como besouros, grilos, gafanhotos e minhocas.

**Características:** Possui uma longa cauda graduada; a cabeça, dorso e asas são listrados de preto. A região próxima aos olhos é acinzentada, e o bico é amarelo.



**SAÍ-ANDORINHA**

*Tersina viridis*



Thraupidae



Dione Sales



*Swallow Tanager*



Média



Pouco Preocupante

**Tamanho:** 14-15 cm

**Peso:** 30-32 g

**Habitat:** Zonas arbustivas com árvores, bordas e interior de florestas.

**Alimentação:** Sementes e frutos silvestres, além de pequenos artrópodes, como besouros, cupins e formigas aladas, borboletas e mariposas.

**Características:** O macho desta espécie é azul-brilhante, com a cara e a garganta negras e a parte inferior branca. A fêmea é esverdeada.



**SAÍ-AZUL**

*Dacnis cayana*



Thraupidae



Dione Sales



*Blue Dacnis*



Alta



Pouco Preocupante

**Tamanho:** 11-13 cm

**Peso:** 15-16 g

**Habitat:** Interior e bordas de florestas e zonas arbustivas com árvores.

**Alimentação:** Sementes, pequenos frutos e néctar, além de pequenos artrópodes, como mariposas, besouros, borboletas, grilos, lagartas, larvas e aranhas.

**Características:** Apresenta dimorfismo sexual. O macho é azul e negro, com as pernas rosadas, enquanto a fêmea é verde, com a cabeça azulada e pernas alaranjadas.





CAMBACICA

*Coereba flaveola*



Thraupidae



Dione Sales

*Bananaquit*



Baixa



Pouco Preocupante

**Tamanho:** 10,5-11,5 cm

**Peso:** 8 g

**Habitat:** Áreas abertas, zonas arbustivas e arborizadas onde existam flores.

**Alimentação:** Néctar, frutas e artrópodes.

**Características:** O dorso, asas e a cauda são marrom-escuras, o peito é amarelo. A coroa e a face têm coloração negra, com uma evidente faixa superciliar branca. O bico é curvado e pontudo.



**TIZIU**

*Volatinia jacarina*



**Thraupidae**




Dione Sales



*Blue-black Grassquit*



Alta



Pouco Preocupante

**Tamanho:** 9-12 cm

**Peso:** 8-12 g

**Habitat:** Áreas abertas e zonas arbustivas.

**Alimentação:** Sementes de gramíneas e pequenos artrópodes, como cupins, formigas, besouros e grilos.

**Características:** O macho é todo preto com brilho azul-metálico, exceto por uma pequena mancha branca na parte inferior das asas, visível durante o voo. A fêmea e o juvenil são pardos estriados. São comumente vistos em bandos.



**PIPIRA-VERMELHA**

*Ramphocelus carbo*



Thraupidae



Dione Sales



*Silver-beaked Tanager*



Alta

LC

Pouco Preocupante

**Tamanho:** 16-19 cm

**Peso:** 25-30,7 g

**Habitat:** Bordas de florestas e zonas arbustivas, geralmente próximas aos corpos d'água.

**Alimentação:** Frutos, sementes e vários artrópodes, como mariposas, aranhas, besouros, grilos e lagartas.

**Características:** A grande característica da espécie é a base branca do bico do macho. Ele possui uma coloração marrom-profundo, com a cabeça, garganta e peito em tons vermelho-escuros. A fêmea não possui a base branca no bico.



**BIGODINHO**

*Sporophila lineola*



Thraupidae



Dione Sales

*Lined Seed-eater*



Média

**LC** Pouco Preocupante

**Tamanho:** 10-11,5 cm

**Peso:** 9 g

**Habitat:** Áreas abertas e zonas arbustivas, geralmente com árvores.

**Alimentação:** Principalmente sementes, mas também pequenos artrópodes, como grilos, besouros, lagartas, larvas e aranhas.

**Características:** O macho é inconfundível pelas áreas brancas na cabeça. As partes inferiores são levemente cinza-claro, possui um bico pequeno e totalmente negro.




**COLEIRO-DO-BREJO**

*Sporophila collaris*



Thraupidae



Dione Sales

*Rusty-collared Seedeater*



Alta



Pouco Preocupante

**Tamanho:** 11-13 cm

**Peso:** 13-14 g

**Habitat:** Várzeas alagadas, ambientes aquáticos com vegetação e zonas arbustivas próximas aos corpos d'água.

**Alimentação:** Sementes e pequenos artrópodes, como grilos e besouros.

**Características:** O macho possui plumagem preta e branca ou preta e amarelado-canela. Altos e lados da cabeça negros com duas pequenas manchas brancas, larga faixa peitoral negra.



CURIÓ

*Sporophila angolensis*



Thraupidae



Dione Sales



*Chestnut-bellied Seed-Finch*



Média



Pouco Preocupante

**Tamanho:** 11-13 cm

**Peso:** 11,4 e 14,5 g

**Habitat:** Bordas de florestas, zonas arbustivas e várzeas próximas aos corpos d'água.

**Alimentação:** Principalmente sementes, mas também pequenos frutos e artrópodes como grilos, besouros, lagartas, larvas e aranhas.

**Características:** O macho possui cabeça, peito, dorso, asas e cauda negras, e região inferior do peito castanha. As asas apresentam um pequeno espéculo branco. O bico é bastante robusto.



**CANÁRIO-DA-TERRA**

*Sicalis flaveola*



Thraupidae



Dione Sales



Saffron Finch



**LC** Pouco Preocupante

**Tamanho:** 12-14 cm

**Peso:** 16-23 g

**Habitat:** Áreas abertas.

**Alimentação:** Principalmente sementes, mas também alguns pequenos invertebrados.

**Características:** Cor amarelo-olivácea, asas e cauda cinza-oliva. Os olhos são pretos e o bico tem a parte superior cor de chifre, e a inferior é amarelada. A fêmea possui corpo oliváceo com estrias pardas por baixo.



**SANHAÇO-DE-COLEIRA**

*Schistochlamys melanopis*



Thrupidae



Dione Sales

*Black-faced Tanager*



Alta

**LC** Pouco Preocupante

**Tamanho:** 18 cm

**Peso:** 40 g

**Habitat:** Mata baixa ribeirinha, cerrado, restinga, campo sujo.

**Alimentação:** Vegetais, frutinhas das árvores e arbustos, frutinhas de cipós, botões e néctar.

**Características:** É uma ave de corpo cinzento, cabeça, garganta e pescoço negros.





CAVALARIA

*Paroaria capitata*



Thraupidae



Dione Sales

*Yellow-billed Cardinal*



Alta



Pouco Preocupante

**Tamanho:** 15-17 cm

**Peso:** 24 g

**Habitat:** Ambientes aquáticos com vegetação, várzeas e áreas abertas perto da água.

**Alimentação:** Sementes, frutos e pequenos invertebrados, como larvas, lagartas, grilos, aranhas e besouros.

**Características:** Possui característico vermelho na cabeça, dorso preto e branco por baixo, e o bico é amarelo-alaranjado.



**SANHAÇO-CINZENTO**

*Thraupis sayaca*



Thraupidae



Dione Sales

*Sayaca Tanager*



**LC** Pouco Preocupante

**Tamanho:** 15-18 cm

**Peso:** 30-42 g

**Habitat:** Bordas de florestas, zonas arbustivas e áreas abertas com árvores.

**Alimentação:** Frutos, flores, néctar, brotos, folhas novas e vários artrópodes, como mariposas, besouros, formigas e cupins alados, larvas, lagartas e grilos.

**Características:** Apresenta coloração geral cinzenta, com as asas e cauda de coloração azul-turquesa. Sua cabeça é cinza.



**SANHAÇO-DO-COQUEIRO**

*Thraupis palmarum*



Thraupidae



Dione Sales

*Palm Tanager*



Alta

**LC** Pouco Preocupante

**Tamanho:** 17-19 cm

**Peso:** 36 g

**Habitat:** Bordas de florestas, zonas arbustivas e áreas abertas, muitas vezes com a presença de palmeiras.

**Alimentação:** Frutos, sementes e vários artrópodes, como formigas e cupins alados, besouros e larvas.

**Características:** A cor esverdeada é dominante, com testa mais amarelada e olho bem escuro.



## Referências

CBRO. **Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos**. Lista das aves do Brasil. Versão 2021. Disponível em: <http://www.cbro.org.br/listas/>. Acesso em: 14 abr. 2023.

GIMENES, Márcio R.; et al. **Aves da planície alagável do alto rio Paraná**. Maringá: Editora da Universidade Estadual de Maringá - Eduem, 2007. 281p.

GWYNNE, John A; et al. **Guia Aves do Brasil: Pantanal e Cerrado**. Vol. 1. São Paulo: Editora Horizonte, 2010. 322 p.

NUNES, Alessandro Pacheco; et al. Checklist of the birds of Mato Grosso do Sul state, Brazil: diversity and conservation. **Papéis Avulsos de Zoologia**, Vol. 62, 2022. 34 p. Disponível em: <https://doi.org/10.11606/1807-0205/2022.62.029>. Acesso em: 25 abr. 2023.

WIKIAVES. A enciclopédia das aves do Brasil. **Wikiaves**. Disponível em: <https://www.wikiaves.com.br/index.php>. Acesso em: 10 abr. 2023.



## Sobre os autores




**Amanda Nobre Barboza de Souza** é bacharel e licenciada em Ciências Biológicas, Mestra em Educação Científica pela Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul.



**Caio Vinicius de Oliveira Prates** é bacharel em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul.



**Claudenice Faxina** é bióloga Mestra em Biologia Vegetal e Doutora em Ecologia e Conservação - Universidade Federal do Mato Grosso do Sul.



**Dione Sales dos Santos** é graduando em Ciências Biológicas, licenciatura. É Guarda-Parque do Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema.



**Reginaldo Oliveira** é bacharel em Turismo, pós-graduado em Gestão Ambiental, Guarda-Parque e gestor do Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema.



## Índice remissivo de nomes científicos

<b>A</b>	
<i>Agelasticus cyanopus</i> .....	131
<i>Amazona aestiva</i> .....	89
<i>Amazonetta brasiliensis</i> .....	24
<i>Amblyramphus holosericeus</i> .....	29
<i>Ammodramus humeralis</i> .....	124
<i>Anhima cornuta</i> .....	21
<i>Anhinga anhinga</i> .....	43
<i>Ara ararauna</i> .....	93
<i>Ara chloropterus</i> .....	94
<i>Aramus guarauna</i> .....	34
<i>Ardea alba</i> .....	47
<i>Ardea cocoi</i> .....	46
<i>Arundinicola leucocephala</i> .....	111
<i>Asio clamator</i> .....	68
<i>Athene cunicularia</i> .....	67
<b>B</b>	
<i>Brotogeris chiriri</i> .....	88
<i>Busarellus nigricollis</i> .....	57
<b>C</b>	
<i>Campephilus melanoleucos</i> .....	81
<i>Camptostoma obsoletum</i> .....	103
<i>Caracara plancus</i> .....	85
<i>Cathartes aura</i> .....	55
<i>Cathartes burrovianus</i> .....	56
<i>Celeus flavescens</i> .....	82
<i>Chloroceryle amazona</i> .....	72
<i>Chloroceryle americana</i> .....	73
<i>Ciconia maguari</i> .....	40
<i>Circus buffoni</i> .....	59
<i>Coereba flaveola</i> .....	137
<i>Colaptes campestris</i> .....	83
<i>Columbina squammata</i> .....	27
<i>Coragyps atratus</i> .....	54
<i>Crotophaga ani</i> .....	30
<i>Crotophaga major</i> .....	29
<i>Cyanocorax chrysops</i> .....	118
<i>Cyanocorax cristatellus</i> .....	117
<b>D</b>	
<i>Dacnis cayana</i> .....	136
<i>Dendrocygna autumnalis</i> .....	23
<i>Dendrocygna viduata</i> .....	22
<i>Donacobius atricapilla</i> .....	120
<b>E</b>	
<i>Egretta thula</i> .....	49
<i>Elaenia flavogaster</i> .....	104
<i>Emberizoides herbicola</i> .....	134
<i>Eupetomena macroura</i> .....	32
<i>Euphonia chlorotica</i> .....	123
<i>Eupsittula aurea</i> .....	91
<b>F</b>	
<i>Falco femoralis</i> .....	87
<i>Falco sparverius</i> .....	86
<i>Fluvicola nengeta</i> .....	112
<i>Forpus xanthopterygius</i> .....	90
<i>Furnarius rufus</i> .....	99
<b>G</b>	
<i>Galbula ruficauda</i> .....	74
<i>Geothlypis aequinoctialis</i> .....	133
<i>Glaucidium brasilianum</i> .....	66



<i>Gnorimopsar chopi</i> .....	130		
<i>Gubernetes yetapa</i> .....	114		
<i>Guira guira</i> .....	28		
		<b>H</b>	
<i>Herpetotheres cachinnans</i> .....	84		
<i>Heterospizias meridionalis</i> .....	60		
<i>Himantopus melanurus</i> .....	36		
<i>Hylocharis chrysur</i> .....	33		
<i>Hymenops perspicillatus</i> .....	115		
		<b>I</b>	
<i>Icterus croconotus</i> .....	127		
<i>Icterus pyrrhopterus</i> .....	128		
		<b>J</b>	
<i>Jabiru mycteria</i> .....	41		
<i>Jacana jacana</i> .....	37		
		<b>L</b>	
<i>Leistes superciliaris</i> .....	126		
<i>Lepidocolaptes angustirostris</i> .....	98		
		<b>M</b>	
<i>Machetornis rixosa</i> .....	108		
<i>Megaceryle torquata</i> .....	71		
<i>Megascops choliba</i> .....	65		
<i>Melanerpes candidus</i> .....	79		
<i>Melanerpes flavifrons</i> .....	80		
<i>Mesembrinibis cayennensis</i> .....	50		
<i>Mimus saturninus</i> .....	122		
<i>Momotus momota</i> .....	70		
<i>Mycteria americana</i> .....	42		
<i>Myiarchus ferox</i> .....	106		
<i>Myiozetetes similis</i> .....	109		
			<b>N</b>
			<i>Nannopterum brasilianum</i> .....
			44
			<i>Nystalus chacuru</i> .....
			75
		<b>P</b>	
			<i>Paroaria capitata</i> .....
			145
			<i>Patagioenas picazuro</i> .....
			25
			<i>Phacellodomus ruber</i> .....
			100
			<i>Phaetusa simplex</i> .....
			39
			<i>Piaya cayana</i> .....
			31
			<i>Picumnus albosquamatus</i> .....
			78
			<i>Pitangus sulphuratus</i> .....
			107
			<i>Platalea ajaja</i> .....
			52
			<i>Primolius maracana</i> .....
			92
			<i>Progne chalybea</i> .....
			119
			<i>Pseudocolopteryx sclateri</i> .....
			105
			<i>Pseudoleistes guirahuro</i> .....
			132
			<i>Psittacara leucophthalmus</i> .....
			95
			<i>Pteroglossus castanotis</i> .....
			77
			<i>Pyrocephalus rubinus</i> .....
			113
		<b>R</b>	
			<i>Ramphastos toco</i> .....
			76
			<i>Ramphocelus carbo</i> .....
			139
			<i>Rhea americana</i> .....
			20
			<i>Rostrhamus sociabilis</i> .....
			58
			<i>Rupornis magnirostris</i> .....
			63
		<b>S</b>	
			<i>Sarcoramphus papa</i> .....
			53
			<i>Schistoclamys melanopis</i> .....
			144
			<i>Sicalis flaveola</i> .....
			143
			<i>Sporophila angolensis</i> .....
			142
			<i>Sporophila collaris</i> .....
			141
			<i>Sporophila lineola</i> .....
			140



*Sternula superciliaris*.....38  
*Synallaxis frontalis*.....101  
*Syrigma sibilatrix*.....48

**T**

*Taraba major*.....97  
*Tersina viridis*.....135  
*Thamnophilus doliatus*.....96  
*Theristicus caudatus*.....51  
*Thraupis palmarum*.....147  
*Thraupis sayaca*.....146  
*Tigrisoma lineatum*.....45  
*Todirostrum cinereum*.....102  
*Trogon surrucura*.....69  
*Turdus leucomelas*.....121  
*Tyrannus savana*.....110  
*Tyto furcata*.....64

**U**

*Urubitinga coronata* ..... 62  
*Urubitinga urubitinga*.....61

**V**

*Vanellus chilensis* .....35  
*Volatinia jacarina*.....138

**X**

*Xolmis velatus*.....116

**Z**

*Zenaida auriculata*.....26  
*Zonotrichia capensis*.....125



## Índice remissivo de nomes em português

<b>A</b>		Canário-do-campo.....134
Acauã..... 84	Carão.....34	Carcará.....85
Águia-cinzenta.....62	Cardeal-do-banhado.....129	Carretão-do-oeste.....131
Alma-de-gato.....31	Cavalaria.....145	Choca-barrada.....96
Andorinha-grande.....119	Choró-boi.....97	Chupim-do-brejo.....132
Anhuma.....21	Coleiro-do-brejo.....141	Colhereiro.....52
Anu-branco.....28	Coró-coró.....50	Coruja-buraqueira.....67
Anu-coroca.....29	Coruja-orelhuda.....68	Corujinha-do-mato.....65
Anu-preto.....30	Curicaca.....51	Curió.....42
Araçari-castanho.....77		
Arapaçu-de-cerrado.....98		
Arara-canindé.....93		
Arara-vermelha.....94		
Ariramba-de-cauda-ruiva.....74		
Avoante.....26		
<b>B</b>		
Beija-flor-dourado ..... 33		
Beija-flor-tesoura.....32		
Bem-te-vi.....107	<b>E</b>	Ema.....20
Benedito-de-testa-amarela.....80	Encontro.....128	
Bentevizinho-de-penacho-vermelho... .....109	<b>F</b>	
Bigodinho.....40	Falcão-de-coleira.....87	
Biguá..... 44	Ferreirinho-relógio.....102	
Biguatinga.....43	Fim-fim.....123	
	Freirinha.....111	
<b>C</b>		
Cabeça-seca.....42	<b>G</b>	
Caburé.....66	Garça-branca-grande.....47	
Cambacica.....137	Garça-branca-pequena.....49	
Canário-da-terra.....143	Garça-moura.....46	



Gavião-belo.....57  
 Gavião-caboclo.....60  
 Gavião-caramujeiro.....58  
 Gavião-carijó.....63  
 Gavião-do-banhado.....59  
 Gavião-preto.....61  
 Galha-do-campo.....117  
 Galha-piçaça.....118  
 Graveteiro.....100  
 Guaracava-de-barriga-amarela...104

**I**

Irerê.....22

**J**

Jaçanã.....37  
 Japacanim.....120  
 João-bobo.....75  
 João-de-barro.....99  
 João-pinto.....127

**L**

Lavadeira-mascarada.....112

**M**

Maguari.....40  
 Maracanã.....92  
 Maria-cavaleira.....106  
 Maria-faceira.....48  
 Marreca-ananá.....24  
 Marreca-cabocla.....23  
 Martim-pescador-grande.....71  
 Martim-pescador-pequeno.....73  
 Martim-pescador-verde.....72

**N**

Noivinha-branca.....116

**P**

Papagaio-verdadeiro.....89  
 Pássaro-preto.....130  
 Periquitão.....95  
 Periquito-de-encontro-amarelo....88  
 Periquito-rei.....91  
 Pernilongo-de-costas-brancas.....36  
 Petrim.....101  
 Pia-cobra.....133  
 Pica-pau-branco.....79  
 Pica-pau-de-cabeça-amarela.....82  
 Pica-pau-de-topete-vermelho.....81  
 Pica-pau-do-campo.....83  
 Picapauzinho-escamoso.....78  
 Pipira-vermelha.....139  
 Polícia-inglesa-do-sul.....126  
 Pomba-asa-branca.....25  
 Príncipe.....113

**Q**

Quero-quero.....35  
 Quiriquiri.....86

**R**

Risadinha.....103  
 Rolinha-fogo-apagou.....27

**S**

Sabiá-barranco.....121  
 Sabiá-do-campo.....122  
 Saí-andorinha.....135



Saí-azul.....	136	Tricolino.....	105
Sanhaço-cinzento.....	146	Trinta-réis-grande.....	39
Sanhaço-de-coleira.....	144	Trinta-réis-pequeno.....	38
Sanhaço-do-coqueiro.....	147	Tucanuçu.....	76
Socó-boi.....	45	Tuiuiú.....	41
Suindara.....	64		
Suiriri-cavaleiro.....	108	<b>U</b>	
Surucuá-variado.....	69	Udu-de-coroa-azul.....	70
		Urubu-de-cabeça-amarela.....	56
<b>T</b>		Urubu-de-cabeça-vermelha.....	55
Tesoura-do-brejo.....	114	Urubu-preto.....	54
Tesourinha.....	110	Urubu-rei.....	53
Tico-tico.....	125		
Tico-tico-do-campo.....	124	<b>V</b>	
Tiziu.....	138	Viuvinha-de-óculos.....	115
Tuim.....	90		



## Índice remissivo de nomes em inglês

<b>A</b>	
Amazonian Motmot.....70	Chopi Blackbird.....130
Amazon Kingfisher.....72	Common Tody-Flycatcher.....102
American Barn Owl.....64	Cocoi Heron.....46
American Kestrel.....86	Crested Caracara.....85
Anhinga.....43	Crested Doradito.....105
Aplomado Falcon.....87	Crimson-crested Woodpecker.....81
	Crowned Eagle.....62
	Curl-crested Jay.....117
<b>B</b>	
Bananaquit.....137	
Barred Antshrike.....96	<b>E</b>
Black-bellied Whistling-Duck.....23	Eared Dove.....26
Black-capped Donacobius.....120	
Black-collared Hawk.....57	<b>F</b>
Black-faced Tanager.....144	Ferruginous Pygmy-Owl.....66
Black Vulture.....54	
Blond-crested Woodpecker.....82	<b>G</b>
Blue-and-yellow Macaw.....93	Gilded Hummingbird.....33
Blue-black Grassquit.....138	Guira Cuckoo.....28
Blue Dacnis.....136	Grassland Sparrow.....124
Blue-winged Macaw.....92	Gray-breasted Martin.....119
Blue-winged Parrotlet.....90	Great Antshrike.....97
Brazilian Teal.....24	Great Black Hawk.....61
Buff-necked Ibis.....51	Great Egret.....47
Burrowing Owl.....67	Greater Ani.....29
	Greater Thornbird.....100
<b>C</b>	Greather Rhea.....20
Campo Flicker.....83	Great Kiskadee.....107
Cattle Tyrant.....108	Green Ibis.....50
Chalk-browed Mockingbird.....122	Green Kingfisher.....73
Chestnut-bellied Seed-Finch.....142	
Chestnut-eared Aracari.....77	<b>H</b>
	Horned Screamer.....21



<b>J</b>		<b>R</b>	
Jabiru.....	41	Red-and-green Macaw.....	4
<b>K</b>		Ringed Kingfisher.....	71
King Vulture.....	53	Roadside Hawk.....	63
<b>L</b>		Roseate Spoonbill.....	52
Large-billed Tern.....	39	Rufescent Tiger-Heron.....	45
Laughing Falcon.....	84	Rufous-collared Sparrow.....	125
Lesser Yellow-headed Vulture.....	56	Rufous Hornero.....	99
Limpkin.....	34	Rufous-tailed Jacamar.....	74
Lined Seedeater.....	140	Rusty-collared Seedeater.....	141
Long-winged Harrier.....	59	<b>S</b>	
<b>M</b>		Saffron Finch.....	143
Maguari Stork.....	40	Savanna Hawk.....	60
Masked Water-Tyrant.....	112	Sayaca Tanager.....	146
Masked Yellowthroat.....	133	Scaled Dove.....	27
<b>N</b>		Scarlet-headed Blackbird.....	129
Narrow-billed Woodcreeper.....	98	Short-crested Flycatcher.....	106
Orange-backed Troupial.....	127	Silver-beaked Tanager.....	139
<b>O</b>		Smooth-billed Ani.....	30
Orange-backed Troupial.....	127	Snail Kite.....	58
<b>P</b>		Snowy Egret.....	49
Palm Tanager.....	147	Social Flycatcher.....	109
Pale-breasted Thrush.....	121	Sooty-fronted Spinetail.....	101
Peach-fronted Parakeet.....	91	Southern Beardless-Tyrannulet...103	
Picazuro Pigeon.....	25	Southern Fork-tailed Flycatcher..110	
Plush-crested Jay.....	118	Southern Lapwing.....	35
Purple-throated Euphonia.....	123	Spectacled Tyrant.....	15
		Squirrel Cuckoo.....	31
		Streamer-tailed Tyrant.....	114
		Striped Owl.....	68
		Surucua Trogon.....	69
		Swallow-tailed Hummingbird.....	32
		Swallow Tanager.....	135



<b>T</b>	
Toco Toucan.....	76
Tropical Screech-Owl.....	65
Turkey Vulture.....	55
Turquoise-fronted Parrot.....	89
<b>V</b>	
Variable Oriole.....	128
Vermilion Flycatcher.....	113
<b>W</b>	
Wattled Jacana.....	37
Wedge-tailed Grass-Finch.....	134
Whistling Heron.....	48
White-backed Stilt.....	36
White-browed Meadowlark.....	126
White-eared Puffbird.....	75
White-eyed Parakeet.....	95
White-faced Whistling-Duck.....	22
White-headed Marsh Tyrant.....	111
White-rumped Monjita.....	116
White-wedged Piculet.....	78
White Woodpecker.....	79
Wood Stork.....	42
<b>Y</b>	
Yellow-bellied Elaenia.....	104
Yellow-billed Cardinal.....	145
Yellow-billed Tern.....	38
Yellow-breasted Blackbird.....	131
Yellow-chevroned Parakeet.....	88
Yellow-fronted Woodpecker.....	80
Yellow-rumped Marshbird.....	132

## Checklist das espécies registradas no PEVRI

<b>ORDEM</b>
<b>Família</b>
<i>Espécie</i>

Nome Científico	Nome Comum em Português	Nome Comum em Inglês
<b>RHEIFORMES</b>		
<b>Rheidae</b>		
<i>Rhea americana</i>	ema	Greater Rhea
<b>TINAMIFORMES</b>		
<b>Tinamidae</b>		
<i>Crypturellus undulatus</i>	jaó	Undulated Tinamou
<i>Crypturellus parvirostris</i>	inhambu-chororó	Small-billed Tinamou
<i>Crypturellus tataupa</i>	inhambu-chintã	Tataupa Tinamou
<i>Rhynchotus rufescens</i>	perdiz	Red-winged Tinamou
<i>Nothura maculosa</i>	codorna-amarela	Spotted Nothura
<b>ANSERIFORMES</b>		
<b>Anhimidae</b>		
<i>Anhima cornuta</i>	anhuma	Horned Screamer
<i>Chauna torquata</i>	tachã	Southern Screamer
<b>Anatidae</b>		
<i>Dendrocygna viduata</i>	irerê	White-faced Whistling-Duck
<i>Dendrocygna autumnalis</i>	marreca-cabocla	Black-bellied Whistling-Duck
<i>Cairina moschata</i>	pato-do-mato	Muscovy Duck
<i>Sarkidiornis sylvicola</i>	pato-de-crista	Comb Duck
<i>Amazonetta brasiliensis</i>	marreca-ananaí	Brazilian Teal
<i>Nomonyx dominicus</i>	marreca-caucau	Masked Duck



Nome Científico	Nome Comum em Português	Nome Comum em Inglês
<b>GALLIFORMES</b>		
<b>Cracidae</b>		
<i>Penelope superciliaris</i>	jacupemba	Rusty-margined Guan
<i>Crax fasciolata</i>	mutum-de-penacho	Bare-faced Curassow
<b>PODICIPEDIFORMES</b>		
<b>Podicipedidae</b>		
<i>Tachybaptus dominicus</i>	mergulhão-pequeno	Least Grebe
<i>Podilymbus podiceps</i>	mergulhão-caçador	Pied-billed Grebe
<b>COLUMBIFORMES</b>		
<b>Columbidae</b>		
<i>Patagioenas picazuro</i>	pomba-asa-branca	Picazuro Pigeon
<i>Patagioenas cayennensis</i>	pomba-galega	Pale-vented Pigeon
<i>Leptotila verreauxi</i>	juriti-pupu	White-tipped Dove
<i>Leptotila rufaxilla</i>	juriti-de-testa-branca	Gray-fronted Dove
<i>Zenaida auriculata</i>	avoante	Eared Dove
<i>Claravis pretiosa</i>	pararu-azul	Blue Ground-Dove
<i>Columbina minuta</i>	rolinha-de-asa-canela	Plain-breasted Ground-Dove
<i>Columbina talpacoti</i>	rolinha-roxa	Ruddy Ground-Dove
<i>Columbina squammata</i>	rolinha-fogo-apagou	Scaled Dove
<i>Columbina picui</i>	rolinha-picuí	Picui Ground-Dove
<b>CUCULIFORMES</b>		
<b>Cuculidae</b>		
<i>Guira guira</i>	anu-branco	Guira Cuckoo
<i>Crotophaga major</i>	anu-coroca	Greater Ani
<i>Crotophaga ani</i>	anu-preto	Smooth-billed Ani
<i>Tapera naevia</i>	saci	Striped Cuckoo
<i>Dromococcyx pavoninus</i>	peixe-frito-pavonino	Pavonine Cuckoo
<i>Coccyua minuta</i>	chincõã-pequeno	Little Cuckoo
<i>Playa cayana</i>	alma-de-gato	Squirrel Cuckoo
<i>Coccyzus melacoryphus</i>	papa-lagarta-acanelado	Dark-billed Cuckoo





Nome Científico	Nome Comum em Português	Nome Comum em Inglês
<b>NYCTIBIIFORMES</b>		
<b>Nyctibiidae</b>		
<i>Nyctibius grandis</i>	urutau-grande	Great Potoo
<i>Nyctibius griseus</i>	urutau	Common Potoo
<b>CAPRIMULGIFORMES</b>		
<b>Caprimulgidae</b>		
<i>Antrostomus rufus</i>	joão-corta-pau	Rufous Nightjar
<i>Nyctidromus albicollis</i>	bacurau	Common Pauraque
<i>Hydropsalis parvula</i>	bacurau-chintã	Little Nightjar
<i>Hydropsalis maculicaudus</i>	bacurau-de-rabo-maculado	Spot-tailed Nightjar
<i>Hydropsalis torquata</i>	bacurau-tesoura	Scissor-tailed Nightjar
<i>Podager nacunda</i>	corucão	Nacunda Nighthawk
<i>Chordeiles acutipennis</i>	bacurau-de-asa-fina	Lesser Nighthawk
<b>APODIFORMES</b>		
<b>Trochilidae</b>		
<i>Florisuga fusca</i>	beija-flor-preto	Black Jacobin
<i>Phaethornis pretrei</i>	rabo-branco-acanelado	Planalto Hermit
<i>Colibri serrirostris</i>	beija-flor-de-orelha-violeta	White-vented Violetear
<i>Polytmus guainumbi</i>	beija-flor-de-bico-curvo	White-tailed Goldenthrroat
<i>Anthracothorax nigricollis</i>	beija-flor-de-veste-preta	Black-throated Mango
<i>Heliomaster squamosus</i>	bico-reto-de-banda-branca	Stripe-breasted Starthroat
<i>Heliomaster furcifer</i>	bico-reto-azul	Blue-tufted Starthroat
<i>Chlorostilbon lucidus</i>	besourinho-de-bico-vermelho	Glittering-bellied Emerald
<i>Eupetomena macroura</i>	beija-flor-tesoura	Swallow-tailed Hummingbird
<i>Chrysornis versicolor</i>	beija-flor-de-banda-branca	Versicolored Emerald
<i>Chionomesa fimbriata</i>	beija-flor-de-garganta-verde	Glittering-throated Emerald
<i>Hylocharis chrysura</i>	beija-flor-dourado	Gilded Hummingbird



Nome Científico	Nome Comum em Português	Nome Comum em Inglês
<b>GRUIFORMES</b>		
<b>Aramidae</b>		
<i>Aramus guarauna</i>	carão	Limpkin
<b>Rallidae</b>		
<i>Porphyrio martinica</i>	frango-d'água-azul	Purple Gallinule
<i>Porphyrio flavirostris</i>	frango-d'água-pequeno	Azure Gallinule
<i>Laterallus melanophaius</i>	sanã-parda	Rufous-sided Crane
<i>Mustelirallus albicollis</i>	sanã-carijó	Ash-throated Crane
<i>Pardirallus nigricans</i>	saracura-sanã	Blackish Rail
<i>Aramides cajaneus</i>	saracura-três-potes	Gray-necked Wood-Rail
<i>Gallinula galeata</i>	galinha-d'água	Common Gallinule
<b>Heliornithidae</b>		
<i>Heliornis fulica</i>	picaparra	Sungrebe
<b>CHARADRIIFORMES</b>		
<b>Charadriidae</b>		
<i>Vanellus chilensis</i>	quero-quero	Southern Lapwing
<b>Recurvirostridae</b>		
<i>Himantopus melanurus</i>	pernilongo-de-costas-brancas	White-backed Stilt
<b>Scolopacidae</b>		
<i>Bartramia longicauda</i>	maçarico-do-campo	Upland Sandpiper
<i>Calidris alba</i>	maçarico-branco	Sanderling
<i>Calidris melanotos</i>	maçarico-de-colete	Pectoral Sandpiper
<i>Gallinago paraguaiae</i>	narceja	South American Snipe
<i>Actitis macularius</i>	maçarico-pintado	Spotted Sandpiper
<i>Tringa solitaria</i>	maçarico-solitário	Solitary Sandpiper
<i>Tringa flavipes</i>	maçarico-de-perna-amarela	Lesser Yellowlegs
<b>Jacaniidae</b>		
<i>Jacana jacana</i>	jaçanã	Wattled Jacana
<b>Laridae</b>		
<i>Rynchops niger</i>	talha-mar	Black Skimmer

Nome Científico	Nome Comum em Português	Nome Comum em Inglês
<b>Laridae</b>		
<i>Sternula superciliaris</i>	trinta-réis-pequeno	Yellow-billed Tern
<i>Phaetusa simplex</i>	trinta-réis-grande	Large-billed Tern
<b>CICONIIFORMES</b>		
<b>Ciconiidae</b>		
<i>Ciconia maguari</i>	maguari	Maguari Stork
<i>Jabiru mycteria</i>	tuiuiú	Jabiru
<i>Mycteria americana</i>	cabeça-seca	Wood Stork
<b>SULIFORMES</b>		
<b>Anhingidae</b>		
<i>Anhinga anhinga</i>	biguatinga	Anhinga
<b>Phalacrocoracidae</b>		
<i>Nannopterum brasilianum</i>	biguá	Neotropic Cormorant
<b>PELECANIFORMES</b>		
<b>Ardeidae</b>		
<i>Tigrisoma lineatum</i>	socó-boi	Rufescent Tiger-Heron
<i>Botaurus pinnatus</i>	socó-boi-baio	Pinnated Bittern
<i>Ixobrychus exilis</i>	socoí-vermelho	Least Bittern
<i>Ixobrychus involucris</i>	socoí-amarelo	Stripe-backed Bittern
<i>Nycticorax nycticorax</i>	socó-dorminhoco	Black-crowned Night-Heron
<i>Butorides striata</i>	socozinho	Striated Heron
<i>Bubulcus ibis</i>	garça-vaqueira	Cattle Egret
<i>Ardea cocoi</i>	garça-moura	Cocoi Heron
<i>Ardea alba</i>	garça-branca-grande	Great Egret
<i>Syrigma sibilatrix</i>	maria-faceira	Whistling Heron
<i>Egretta thula</i>	garça-branca-pequena	Snowy Egret
<b>Threskiornithidae</b>		
<i>Plegadis chihi</i>	caraúna	White-faced Ibis
<i>Mesembrinibis cayennensis</i>	coró-coró	Green Ibis



Nome Científico	Nome Comum em Português	Nome Comum em Inglês
<b>Threskiornithidae</b>		
<i>Phimosus infuscatus</i>	tapicuru	Bare-faced Ibis
<i>Theristicus caerulescens</i>	curicaca-real	Plumbeous Ibis
<i>Theristicus caudatus</i>	curicaca	Buff-necked Ibis
<i>Platalea ajaja</i>	colhereiro	Roseate Spoonbill
<b>CATHARTIFORMES</b>		
<b>Cathartidae</b>		
<i>Sarcoramphus papa</i>	urubu-rei	King Vulture
<i>Coragyps atratus</i>	urubu-preto	Black Vulture
<i>Cathartes aura</i>	urubu-de-cabeça-vermelha	Turkey Vulture
<i>Cathartes burrovianus</i>	urubu-de-cabeça-amarela	Lesser Yellow-headed Vulture
<b>ACCIPITRIFORMES</b>		
<b>Pandionidae</b>		
<i>Pandion haliaetus</i>	águia-pescadora	Osprey
<b>Accipitridae</b>		
<i>Gampsonyx swainsonii</i>	gaviãozinho	Pearl Kite
<i>Elanus leucurus</i>	gavião-peneira	White-tailed Kite
<i>Leptodon cayanensis</i>	gavião-gato	Gray-headed Kite
<i>Elanoides forficatus</i>	gavião-tesoura	Swallow-tailed Kite
<i>Busarellus nigricollis</i>	gavião-belo	Black-collared Hawk
<i>Rostrhamus sociabilis</i>	gavião-caramujeiro	Snail Kite
<i>Ictinia plumbea</i>	sovi	Plumbeous Kite
<i>Circus buffoni</i>	gavião-do-banhado	Long-winged Harrier
<i>Geranospiza caerulescens</i>	gavião-pernilongo	Crane Hawk
<i>Heterospizias meridionalis</i>	gavião-caboclo	Savanna Hawk
<i>Urubitinga urubitinga</i>	gavião-preto	Great Black Hawk
<i>Urubitinga coronata</i>	águia-cinzenta	Crowned Eagle
<i>Rupornis magnirostris</i>	gavião-carijó	Roadside Hawk
<i>Geranoaetus albicaudatus</i>	gavião-de-rabo-branco	White-tailed Hawk
<i>Buteo brachyurus</i>	gavião-de-cauda-curta	Short-tailed Hawk
<i>Buteo swainsoni</i>	gavião-papa-gafanhoto	Swainson's Hawk

Nome Científico	Nome Comum em Português	Nome Comum em Inglês
<b>STRIGIFORMES</b>		
<b>Tytonidae</b>		
<i>Tyto furcata</i>	suindara	American Barn Owl
<b>Strigidae</b>		
<i>Megascops choliba</i>	corujinha-do-mato	Tropical Screech-Owl
<i>Pulsatrix perspicillata</i>	murucututu	Spectacled Owl
<i>Bubo virginianus</i>	jacurutu	Great Horned Owl
<i>Glaucidium brasilianum</i>	caburé	Ferruginous Pygmy-Owl
<i>Athene cucularia</i>	coruja-buraqueira	Burrowing Owl
<i>Asio clamator</i>	coruja-orelhuda	Striped Owl
<i>Asio flammeus</i>	mocho-dos-banhados	Short-eared Owl
<b>TROGONIFORMES</b>		
<b>Trogonidae</b>		
<i>Trogon surrucura</i>	surucuá-variado	Surucua Trogon
<b>CORACIIFORMES</b>		
<b>Momotidae</b>		
<i>Baryphthengus ruficapillus</i>	juruva	Rufous-capped Motmot
<i>Momotus momota</i>	udu-de-coroa-azul	Amazonian Motmot
<b>Alcedinidae</b>		
<i>Megaceryle torquata</i>	martim-pescador-grande	Ringed Kingfisher
<i>Chloroceryle amazona</i>	martim-pescador-verde	Amazon Kingfisher
<i>Chloroceryle aenea</i>	martim-pescador-miúdo	American Pygmy Kingfisher
<i>Chloroceryle americana</i>	martim-pescador-pequeno	Green Kingfisher
<i>Chloroceryle inda</i>	martim-pescador-da-mata	Green-and-rufous Kingfisher
<b>GALBULIFORMES</b>		
<b>Galbulidae</b>		
<i>Galbula ruficauda</i>	ariramba-de-cauda-ruiva	Rufous-tailed Jacamar
<b>Bucconidae</b>		
<i>Notharchus swainsoni</i>	macuru-de-barriga-castanha	Buff-bellied Puffbird



Nome Científico	Nome Comum em Português	Nome Comum em Inglês
<b>Bucconidae</b>		
<i>Nystalus striatipectus</i>	rapazinho-do-chaco	Chaco Puffbird
<i>Nystalus chacuru</i>	joão-bobo	White-eared Puffbird
<b>PICIFORMES</b>		
<b>Ramphastidae</b>		
<i>Ramphastos toco</i>	tucanuçu	Toco Toucan
<i>Pteroglossus castanotis</i>	araçari-castanho	Chestnut-eared Aracari
<b>Picidae</b>		
<i>Picumnus albosquamatus</i>	picapauzinho-escamoso	White-wedged Piculet
<i>Melanerpes candidus</i>	pica-pau-branco	White Woodpecker
<i>Melanerpes flavifrons</i>	benedito-de-testa-amarela	Yellow-fronted Woodpecker
<i>Veniliornis passerinus</i>	pica-pau-pequeno	Little Woodpecker
<i>Campephilus melanoleucos</i>	pica-pau-de-topete-vermelho	Crimson-crested Woodpecker
<i>Campephilus robustus</i>	pica-pau-rei	Robust Woodpecker
<i>Dryocopus lineatus</i>	pica-pau-de-banda-branca	Lineated Woodpecker
<i>Celeus flavescens</i>	pica-pau-de-cabeça-amarela	Blond-crested Woodpecker
<i>Colaptes melanochloros</i>	pica-pau-verde-barrado	Green-barred Woodpecker
<i>Colaptes campestris</i>	pica-pau-do-campo	Campo Flicker
<b>CARIAMIFORMES</b>		
<b>Cariamidae</b>		
<i>Cariama cristata</i>	seriema	Red-legged Seriema
<b>FALCONIFORMES</b>		
<b>Falconidae</b>		
<i>Herpetotheres cachinnans</i>	acauã	Laughing Falcon
<i>Caracara plancus</i>	carcará	Crested Caracara
<i>Milvago chimachima</i>	carrapateiro	Yellow-headed Caracara
<i>Milvago chimango</i>	chimango	Chimango Caracara

Nome Científico	Nome Comum em Português	Nome Comum em Inglês
<b>Falconidae</b>		
<i>Falco sparverius</i>	quiriquiri	American Kestrel
<i>Falco rufigularis</i>	cauré	Bat Falcon
<i>Falco femoralis</i>	falcão-de-coleira	Aplomado Falcon
<b>PSITTACIFORMES</b>		
<b>Psittacidae</b>		
<i>Myiopsitta monachus</i>	caturrita	Monk Parakeet
<i>Brotogeris chiriri</i>	periquito-de-encontro-amarelo	Yellow-chevroned Parakeet
<i>Alipiopsitta xanthops</i>	papagaio-galego	Yellow-faced Parrot
<i>Amazona aestiva</i>	papagaio-verdadeiro	Turquoise-fronted Parrot
<i>Forpus xanthopterygius</i>	tuim	Blue-winged Parrotlet
<i>Pyrrhura frontalis</i>	tiriba-de-testa-vermelha	Maroon-bellied Parakeet
<i>Eupsittula aurea</i>	periquito-rei	Peach-fronted Parakeet
<i>Orthopsittaca manilatus</i>	maracanã-do-buriti	Red-bellied Macaw
<i>Primolius maracana</i>	maracanã	Blue-winged Macaw
<i>Ara ararauna</i>	arara-canindé	Blue-and-yellow Macaw
<i>Ara chloropterus</i>	arara-vermelha	Red-and-green Macaw
<i>Diopsittaca nobilis</i>	maracanã-pequena	Red-shouldered Macaw
<i>Psittacara leucophthalmus</i>	periquitão	White-eyed Parakeet
<b>PASSERIFORMES</b>		
<b>Thamnophilidae</b>		
<i>Formicivora rufa</i>	papa-formiga-vermelho	Rusty-backed Antwren
<i>Herpsilochmus longirostris</i>	chorozinho-de-bico-comprido	Large-billed Antwren
<i>Herpsilochmus atricapillus</i>	chorozinho-de-chapéu-preto	Black-capped Antwren
<i>Thamnophilus doliatus</i>	choca-barrada	Barred Antshrike
<i>Taraba major</i>	choró-boi	Great Antshrike



Nome Científico	Nome Comum em Português	Nome Comum em Inglês
<b>Dendrocolaptidae</b>		
<i>Dendrocolaptes platyrostris</i>	arapaçu-grande	Planalto Woodcreeper
<i>Campylorhamphus trochilirostris</i>	arapaçu-beija-flor	Red-billed Scythebill
<i>Lepidocolaptes angustirostris</i>	arapaçu-de-cerrado	Narrow-billed Woodcreeper
<b>Furnariidae</b>		
<i>Furnarius figulus</i>	casaca-de-couro-da-lama	Wing-banded Hornero
<i>Furnarius rufus</i>	joão-de-barro	Rufous Hornero
<i>Clibanornis rectirostris</i>	cisqueiro-do-rio	Chestnut-capped Foliage-gleaner
<i>Automolus leucophthalmus</i>	barranqueiro-de-olho-branco	White-eyed Foliage-gleaner
<i>Phacellodomus ruber</i>	graveteiro	Greater Thornbird
<i>Cranioleuca vulpina</i>	arredio-do-rio	Rusty-backed Spinetail
<i>Certhiaxis cinnamomeus</i>	curutié	Yellow-chinned Spinetail
<i>Schoeniophylax phryganophilus</i>	bichoita	Chotoy Spinetail
<i>Synallaxis hypospodia</i>	joão-grilo	Cinereous-breasted Spinetail
<i>Synallaxis albescens</i>	uí-pi	Pale-breasted Spinetail
<b>Pipridae</b>		
<i>Neopelma pallescens</i>	fruxu-do-cerradão	Pale-bellied Tyrant-Manakin
<i>Antilophia galeata</i>	soldadinho	Helmeted Manakin
<i>Pipra fasciicauda</i>	uirapuru-laranja	Band-tailed Manakin
<b>Tityridae</b>		
<i>Tityra inquisitor</i>	anambé-branco-de-bochecha-parda	Black-crowned Tityra
<i>Tityra cayana</i>	anambé-branco-de-rabo-preto	Black-tailed Tityra
<i>Pachyramphus viridis</i>	caneleiro-verde	Green-backed Becard
<i>Pachyramphus polychopterus</i>	caneleiro-preto	White-winged Becard
<i>Pachyramphus validus</i>	caneleiro-de-chapéu-preto	Crested Becard



Nome Científico	Nome Comum em Português	Nome Comum em Inglês
<b>Rhynchocyclidae</b>		
<i>Leptopogon amaurocephalus</i>	cabecudo	Sepia-capped Flycatcher
<i>Todirostrum cinereum</i>	ferreirinho-relógio	Common Tody-Flycatcher
<i>Poecilotriccus latirostris</i>	ferreirinho-de-cara-parda	Rusty-fronted Tody-Flycatcher
<i>Hemitriccus margaritaceiventer</i>	sebinho-de-olho-de-ouro	Pearly-vented Tody-tyrant
<b>Tyrannidae</b>		
<i>Hirundinea ferruginea</i>	gibão-de-couro	Cliff Flycatcher
<i>Euscarthmus meloryphus</i>	barulhento	Tawny-crowned Pygmy-Tyrant
<i>Camptostoma obsoletum</i>	risadinha	Southern Beardless-Tyrannulet
<i>Elaenia flavogaster</i>	guaracava-de-barriga-amarela	Yellow-bellied Elaenia
<i>Elaenia spectabilis</i>	guaracava-grande	Large Elaenia
<i>Elaenia parvirostris</i>	tuque-pium	Small-billed Elaenia
<i>Elaenia mesoleuca</i>	tuque	Olivaceous Elaenia
<i>Elaenia cristata</i>	guaracava-de-topete-uniforme	Plain-crested Elaenia
<i>Elaenia chiriquensis</i>	chibum	Lesser Elaenia
<i>Elaenia obscura</i>	tucão	Small-headed Elaenia
<i>Myiopagis gaimardii</i>	maria-pechim	Forest Elaenia
<i>Myiopagis caniceps</i>	guaracava-cinzenta	Gray Elaenia
<i>Myiopagis viridicata</i>	guaracava-de-crista-alaranjada	Greenish Elaenia
<i>Capsiempis flaveola</i>	marianinha-amarela	Yellow Tyrannulet
<i>Phaeomyias murina</i>	bagageiro	Mouse-colored Tyrannulet
<i>Polystictus pectoralis</i>	papa-moscas-canela	Bearded Tachuri
<i>Pseudocolopteryx sclateri</i>	tricolino	Crested Doradito
<i>Pseudocolopteryx flaviventris</i>	amarelinho-do-junco	Warbling Doradito
<i>Serpophaga subcristata</i>	alegrinho	White-crested Tyrannulet
<i>Legatus leucophaeus</i>	bem-te-vi-pirata	Piratic Flycatcher



Nome Científico	Nome Comum em Português	Nome Comum em Inglês
<b>Tyrannidae</b>		
<i>Myiarchus swainsoni</i>	irré	Swainson's Flycatcher
<i>Myiarchus ferox</i>	maria-cavaleira	Short-crested Flycatcher
<i>Myiarchus tyrannulus</i>	maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado	Brown-crested Flycatcher
<i>Casiornis rufus</i>	maria-ferrugem	Rufous Casiornis
<i>Pitangus sulphuratus</i>	bem-te-vi	Great Kiskadee
<i>Philohydor lictor</i>	bentevizinho-do-brejo	Lesser Kiskadee
<i>Machetornis rixosa</i>	suiriri-cavaleiro	Cattle Tyrant
<i>Myiodynastes maculatus</i>	bem-te-vi-rajado	Streaked Flycatcher
<i>Megarynchus pitangua</i>	neinei	Boat-billed Flycatcher
<i>Myiozetetes cayanensis</i>	bentevizinho-de-asa-ferrugínea	Rusty-margined Flycatcher
<i>Myiozetetes similis</i>	bentevizinho-de-penacho-vermelho	Social Flycatcher
<i>Tyrannus albogularis</i>	suiriri-de-garganta-branca	White-throated Kingbird
<i>Tyrannus melancholicus</i>	suiriri	Tropical Kingbird
<i>Tyrannus savana</i>	tesourinha	Southern Fork-tailed Flycatcher
<i>Tyrannus tyrannus</i>	suiriri-valente	Eastern Kingbird
<i>Griseotyrannus aurantioatrocristatus</i>	peitica-de-chapéu-preto	Crowned Slaty Flycatcher
<i>Empidonomus varius</i>	peitica	Variiegated Flycatcher
<i>Sublegatus modestus</i>	guaracava-modesta	Southern Scrub-Flycatcher
<i>Colonia colonus</i>	viuvinha	Long-tailed Tyrant
<i>Arundinicola leucocephala</i>	freirinha	White-headed Marsh Tyrant
<i>Fluvicola albiventer</i>	lavadeira-de-cara-branca	Black-backed Water-Tyrant
<i>Fluvicola nengeta</i>	lavadeira-mascarada	Masked Water-Tyrant
<i>Pyrocephalus rubinus</i>	príncipe	Vermilion Flycatcher

Nome Científico	Nome Comum em Português	Nome Comum em Inglês
<b>Tyrannidae</b>		
<i>Gubernetes yetapa</i>	tesoura-do-brejo	Streamer-tailed Tyrant
<i>Myiophobus fasciatus</i>	filipe	Bran-colored Flycatcher
<i>Cnemotriccus fuscatus</i>	guaracavuçu	Fuscous Flycatcher
<i>Lathrotriccus euleri</i>	enferrujado	Euler's Flycatcher
<i>Contopus virens</i>	piuí-verdadeiro-do-leste	Eastern Wood-Pewee
<i>Satrapa icterophrys</i>	suiriri-pequeno	Yellow-browed Tyrant
<i>Hymenops perspicillatus</i>	viuvinha-de-óculos	Spectacled Tyrant
<i>Knipolegus lophotes</i>	maria-preta-de-penacho	Crested Black-Tyrant
<i>Xolmis velatus</i>	noivinha-branca	White-rumped Monjita
<i>Nengetus cinereus</i>	primavera	Gray Monjita
<b>Vireonidae</b>		
<i>Cyclarhis gujanensis</i>	pitiguari	Rufous-browed Peppershrike
<i>Hylophilus pectoralis</i>	vite-vite-de-cabeça-cinza	Ashy-headed Greenlet
<i>Vireo chivi</i>	juruviara	Chivi Vireo
<b>Corvidae</b>		
<i>Cyanocorax cyanomelas</i>	gralha-do-pantanal	Purplish Jay
<i>Cyanocorax cristatellus</i>	gralha-do-campo	Curl-crested Jay
<i>Cyanocorax chrysops</i>	gralha-picaça	Plush-crested Jay
<b>Hirundinidae</b>		
<i>Stelgidopteryx ruficollis</i>	andorinha-serradora	Southern Rough-winged Swallow
<i>Progne tapera</i>	andorinha-do-campo	Brown-chested Martin
<i>Progne chalybea</i>	andorinha-grande	Gray-breasted Martin
<i>Tachycineta albiventer</i>	andorinha-do-rio	White-winged Swallow
<i>Tachycineta leucorrhoa</i>	andorinha-de-sobre-branco	White-rumped Swallow
<i>Hirundo rustica</i>	andorinha-de-bando	Barn Swallow



Nome Científico	Nome Comum em Português	Nome Comum em Inglês
<b>Troglodytidae</b>		
<i>Troglodytes musculus</i>	corruíra	Southern House Wren
<i>Campylorhynchus turdinus</i>	catatau	Thrush-like Wren
<i>Cantorchilus leucotis</i>	garrincho-de-barriga-vermelha	Buff-breasted Wren
<b>Poliopitilidae</b>		
<i>Poliopitila dumicola</i>	balança-rabo-de-máscara	Masked Gnatcatcher
<b>Donacobiidae</b>		
<i>Donacobius atricapilla</i>	japacanim	Black-capped Donacobius
<b>Turdidae</b>		
<i>Turdus leucomelas</i>	sabiá-barranco	Pale-breasted Thrush
<i>Turdus rufiventris</i>	sabiá-laranjeira	Rufous-bellied Thrush
<i>Turdus amaurochalinus</i>	sabiá-poca	Creamy-bellied Thrush
<b>Mimidae</b>		
<i>Mimus saturninus</i>	sabiá-do-campo	Chalk-browed Mockingbird
<i>Mimus triurus</i>	calhandra-de-três-rabos	White-banded Mockingbird
<b>Passeridae</b>		
<i>Passer domesticus</i>	pardal	House Sparrow
<b>Motacillidae</b>		
<i>Anthus chii</i>	caminheiro-zumbidor	Yellowish Pipit
<b>Fringillidae</b>		
<i>Euphonia chlorotica</i>	fim-fim	Purple-throated Euphonia
<i>Euphonia violacea</i>	gaturamo-verdadeiro	Violaceous Euphonia
<b>Passerellidae</b>		
<i>Ammodramus humeralis</i>	tico-tico-do-campo	Grassland Sparrow
<i>Arremon flavirostris</i>	tico-tico-de-bico-amarelo	Saffron-billed Sparrow
<i>Zonotrichia capensis</i>	tico-tico	Rufous-collared Sparrow



Nome Científico	Nome Comum em Português	Nome Comum em Inglês
<b>Icteridae</b>		
<i>Dolichonyx oryzivorus</i>	triste-pia	Bobolink
<i>Leistes superciliaris</i>	polícia-inglesa-do-sul	White-browed Meadowlark
<i>Cacicus solitarius</i>	iraúna-de-bico-branco	Solitary Black Cacique
<i>Cacicus haemorrhous</i>	guaxe	Red-rumped Cacique
<i>Icterus croconotus</i>	joão-pinto	Orange-backed Troupial
<i>Icterus pyrrhopterus</i>	encontro	Variable Oriole
<i>Molothrus rufoaxillaris</i>	chupim-azeviche	Screaming Cowbird
<i>Molothrus oryzivorus</i>	iraúna-grande	Giant Cowbird
<i>Molothrus bonariensis</i>	chupim	Shiny Cowbird
<i>Amblyramphus holosericeus</i>	cardeal-do-banhado	Scarlet-headed Blackbird
<i>Gnorimopsar chopi</i>	pássaro-preto	Chopi Blackbird
<i>Agelaioides badius</i>	asa-de-telha	Grayish Baywing
<i>Agelasticus cyanopus</i>	carretão-do-oeste	Yellow-breasted Blackbird
<i>Chrysomus ruficapillus</i>	garibaldi	Chestnut-capped Blackbird
<i>Pseudoleistes guirahuro</i>	chupim-do-brejo	Yellow-rumped Marshbird
<b>Parulidae</b>		
<i>Geothlypis aequinoctialis</i>	pia-cobra	Masked Yellowthroat
<i>Setophaga pitiayumi</i>	mariquita	Tropical Parula
<i>Myiothlypis flaveola</i>	canário-do-mato	Flavescent Warbler
<i>Basileuterus culicivorus</i>	pula-pula	Golden-crowned Warbler
<b>Cardinalidae</b>		
<i>Cyanoloxia glaucoacaerulea</i>	azulinho	Glaucous-blue Grosbeak
<b>Thraupidae</b>		
<i>Nemosia pileata</i>	saíra-de-chapéu-preto	Hooded Tanager
<i>Embernagra platensis</i>	sabiá-do-banhado	Great Pampa-Finch



Nome Científico	Nome Comum em Português	Nome Comum em Inglês
<b>Thraupidae</b>		
<i>Emberizoides herbicola</i>	canário-do-campo	Wedge-tailed Grass-Finch
<i>Emberizoides Ypiranganus</i>	canário-do-brejo	Lesser Grass-Finch
<i>Hemithraupis guira</i>	saíra-de-papo-preto	Guira Tanager
<i>Tersina viridis</i>	saí-andorinha	Swallow Tanager
<i>Cyanerpes cyaneus</i>	saíra-beija-flor	Red-legged Honeycreeper
<i>Dacnis cayana</i>	saí-azul	Blue Dacnis
<i>Saltatricula atricollis</i>	batuqueiro	Black-throated Saltator
<i>Saltator coerulescens</i>	trinca-ferro-gongá	Grayish Saltator
<i>Saltator similis</i>	trinca-ferro	Green-winged Saltator
<i>Coereba flaveola</i>	cambacica	Bananaquit
<i>Volatinia jacarina</i>	tiziu	Blue-black Grassquit
<i>Eucometis penicillata</i>	pipira-da-taoca	Gray-headed Tanager
<i>Coryphospingus cucullatus</i>	tico-tico-rei	Red-crested Finch
<i>Ramphocelus carbo</i>	pipira-vermelha	Silver-beaked Tanager
<i>Sporophila lineola</i>	bigodinho	Lined Seedeater
<i>Sporophila plumbea</i>	patativa	Plumbeous Seedeater
<i>Sporophila collaris</i>	coleiro-do-brejo	Rusty-collared Seedeater
<i>Sporophila nigricollis</i>	baiano	Yellow-bellied Seedeater
<i>Sporophila caeruleascens</i>	coleirinho	Double-collared Seedeater
<i>Sporophila leucoptera</i>	chorão	White-bellied Seedeater
<i>Sporophila pileata</i>	caboclinho-coroado	Pearly-bellied Seedeater
<i>Sporophila hypoxantha</i>	caboclinho-de-barriga-vermelha	Tawny-bellied Seedeater
<i>Sporophila ruficollis</i>	caboclinho-de-papo-escuro	Dark-throated Seedeater

Nome Científico	Nome Comum em Português	Nome Comum em Inglês
<b>Thraupidae</b>		
<i>Sporophila palustris</i>	caboclinho-de-papo-branco	Marsh Seedeater
<i>Sporophila cinnamomea</i>	caboclinho-de-chapéu-cinzento	Chestnut Seedeater
<i>Sporophila angolensis</i>	curió	Chestnut-bellied Seed-Finch
<i>Thlypopsis sordida</i>	saí-canário	Orange-headed Tanager
<i>Donacospiza albifrons</i>	tico-tico-do-banhado	Long-tailed Reed Finch
<i>Conirostrum speciosum</i>	figuinha-de-rabo-castanho	Chestnut-vented Conebill
<i>Sicalis flaveola</i>	canário-da-terra	Saffron Finch
<i>Sicalis luteola</i>	tipio	Grassland Yellow-Finch
<i>Schistochlamys melanopsis</i>	sanhaço-de-coleira	Black-faced Tanager
<i>Paroaria coronata</i>	cardeal	Red-crested Cardinal
<i>Paroaria capitata</i>	cavalaria	Yellow-billed Cardinal
<i>Thraupis sayaca</i>	sanhaço-cinzento	Sayaca Tanager
<i>Thraupis palmarum</i>	sanhaço-do-coqueiro	Palm Tanager
<i>Stilpnia preciosa</i>	saíra-preciosa	Chestnut-backed Tanager
<i>Stilpnia cayana</i>	saíra-amarela	Burnished-buff Tanager





**SEMADESC**  
Secretaria de Estado  
de Meio Ambiente,  
Desenvolvimento, Ciência,  
Tecnologia e Inovação



ISBN 978-65-85640-01-5



9 786585 640015

editora **ECO**  
Didática



# Guia Fotográfico de Aves

# PARQUE ESTADUAL DAS VÁRZEAS DO RIO IVINHEMA

Organizadores

Caio Vinicius de Oliveira Prates

Dione Sales dos Santos

Amanda Nobre Barboza de Souza

Reginaldo Oliveira

Claudenice Faxina

